

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ADVOCIN ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 25mg / ml

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

Pfizer Hellas ΑΕ, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800

ΑΜΚ:23396/30-3-09

Παρασκευαστής:

Pfizer PGM, Amboise Cedex

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Advocin ενέσιμο διάλυμα

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ (Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε 1 ml του προϊόντος περιέχει:

Δραστικά συστατικά

Ουσία

Danofloxacin 25

Danofloxacin ως 31.73^A

Έκδοχα

Lactic acid

Sodium hydroxide

Monothioglycerol

Liquefied phenol

Nitrogen

Water for injection

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιμο εναιώρημα. Ένα διαυγές στείρο υδατικό διάλυμα.

4. ΕΝΔΕΙΞΗ (ΕΙΣ)

Βοοειδή

Θεραπεία των αναπνευστικών νόσων που προκαλούνται από την *P.haemolytica* και την *P.multocida* και των εντερικών νόσων που προκαλούνται από την *E.coli* και την *Salmonella spp.*

Χοίροι.

Θεραπεία των αναπνευστικών νόσων που προκαλούνται από την *P.multocida* και *A.pleuropneumoniae* και των εντερικών νόσων που προκαλούνται από την *E.coli*

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Καμιά

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν έχουν παρατηρηθεί

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών χρήσεως, παρακαλούμε ενημερώστε τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Βοοειδή και χοίροι.

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ (ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Βοοειδή. Το Advocin ενέσιμο εναιώρημα μπορεί να χορηγηθεί ενδομυϊκά, ενδοφλέβια σε δόση των 1,25 mg/kg σωματικού βάρους (1 ml του ιδιοσκευάσματος ανά 20 kg σωματικού βάρους). Πρέπει να γίνονται 3 χορηγήσεις ανά 24ωρο. Η θεραπεία μπορεί να συνεχισθεί για 2 ακόμα ημέρες σε ζώα τα οποία δεν ανάρρωσαν πλήρως μετά τις αρχικές 3 χορηγήσεις. Να μην ενίονται περισσότερα από 20ml στο ίδιο σημείο του σώματος.

Χοίροι. Το Advocin ενέσιμο εναιώρημα χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση στη δόση 1,25 mg/kg σωματικού βάρους (1 ml του ιδιοσκευάσματος ανά 20 kg σωματικού βάρους). Θα πρέπει να γίνονται 3 χορηγήσεις ανά 24ωρο. Να μην ενίονται περισσότερα από 5ml σε ένα μόνο σημείο.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Βοοειδή.

Να μην ενίονται περισσότερα από 20ml στο ίδιο σημείο του σώματος.

Χοίροι.

Θα πρέπει να γίνονται 3 χορηγήσεις ανά 24ωρο. Να μην ενίονται περισσότερα από 5ml σε ένα μόνο σημείο.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Βοοειδή: (Κρέας και εδώδιμοι ιστοί) : 5 ημέρες

Γάλα: 2 ημέρες

Χοίροι : 3 ημέρες

11.ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μικρότερες των 30°C.

12. ΕΙΔΙΚΗ (ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣ)

Να φυλάγεται μακριά από τα παιδιά.

Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση.

Η παρατεταμένη χορήγηση αντιβιοτικών μιας συγκεκριμένης ομάδας, μπορεί να έχει αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανοχής σε ένα βακτηριακό πληθυσμό.

Οι φθοροκινολόνες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την θεραπεία κλινικών καταστάσεων, οι οποίες έχουν ανταποκριθεί μερικώς ή αναμένεται να ανταποκριθούν μερικώς σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών ουσιών.

Εάν είναι δυνατόν η χρήση των φθοροκινολονών να βασίζεται σε δοκιμές ευαισθησίας.

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αντιμικροβιακή πολιτική, όταν χρησιμοποιείται το προϊόν.

Η χρήση του προϊόντος εκτός των οδηγιών που περιλαμβάνονται στο Π.Χ.Π., πιθανόν να αυξήσει την αντίσταση των βακτηρίων στις φθοροκινολόνες και μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες κινολόνες λόγω πιθανής διασταυρούμενης ανθεκτικότητας.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έγκυα βοοειδή.

Τα αποτελέσματα της δανοφλοξακίνης στην αναπαραγωγή των χοίρων δεν έχουν αξιολογηθεί.

**13.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**

Δεν εφαρμόζεται

Να χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή.

Τηλ. Κέντρου Δηλ.: 210 7793777