

ANTIROBE®**ΚΑΨΟΥΛΕΣ****Αντιβιοτικό από το στόμα****ΣΥΝΘΕΣΗ**

ANTIROBE Κάψουλες 25 mg: Υδροχλωρική κλινδαμυκίνη (=κλινδαμυκίνη 25 mg)- και έκδοχα (λακτόζη - άμυλο αραβοσίτου - τάλκης και στεατικό μαγνήσιο).

ANTIROBE Κάψουλες 75 mg: Υδροχλωρική κλινδαμυκίνη (=κλινδαμυκίνη 75 mg)- και έκδοχα (λακτόζη - άμυλο αραβοσίτου - τάλκης και στεατικό μαγνήσιο).

ANTIROBE Κάψουλες 150mg: Υδροχλωρική κλινδαμυκίνη (=κλινδαμυκίνη 150mg)- και έκδοχα (Λακτόζη - Αμυλο αραβοσίτου - τάλκης και στεατικό μαγνήσιο).

ANTIROBE Κάψουλες 300mg: Υδροχλωρική κλινδαμυκίνη (=κλινδαμυκίνη 300mg)- και έκδοχα (Λακτόζη - Αμυλο αραβοσίτου - τάλκης και στεατικό μαγνήσιο).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Σκύλοι : Το **ANTIROBE** ενδείκνυται στη θεραπεία μολυσμένων τραυμάτων, αποστημάτων και λοιμώξεων της στοματικής κοιλότητας και δοντιών, που προκαλούνται ή επιπλέκονται από *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* (με εξαίρεση τον *Enterococcus faecalis*), *Bacteroides spp.*, *Fusobacterium necrophorum* και *Clostridium perfringens*. Το **ANTIROBE** συνιστάται επίσης στη θεραπεία της οστεομυελίτιδας που οφείλεται στο *Staphylococcus aureus*. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παροχή αντιμικροβιακής κάλυψης κατά τη διάρκεια οδοντικών επεμβάσεων.

Γάτες (μόνο η συσκευασία των 25 mg ανά κάψουλα): Το **ANTIROBE** ενδείκνυται στη θεραπεία μολυσμένων τραυμάτων και αποστημάτων και λοιμώξεων της στοματικής κοιλότητας και δοντιών, που προκαλούνται από βακτήρια ευαίσθητα στην κλινδαμυκίνη. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παροχή αντιμικροβιακής κάλυψης κατά τη διάρκεια οδοντικών επεμβάσεων.

Πριν από την έναρξη της θεραπείας με **ANTIROBE** θα πρέπει να γίνεται ταυτοποίηση του παθογόνου παράγοντα και να ελέγχεται η ευαισθησία του στην κλινδαμυκίνη.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η χρήση του **ANTIROBE** κάψουλες αντενδείκνυται σε ζώα υπερευαίσθητα στην κλινδαμυκίνη και λινκομυκίνη. Να μη χορηγείται σε κουνέλια, κρικητούς, ινδικά χοιρίδια, άλογα, μηρυκαστικά και τσιντσιλά γιατί μπορεί να προκαλέσει γαστροεντερικές διαταραχές.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το **ANTIROBE** μερικές φορές προκαλεί την ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό μη ευαίσθητων μικροοργανισμών όπως μερικών κλωστρίδιων και μυκήτων. Σε περίπτωση που αυτό οδηγήσει σε λοίμωξη πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ανάλογα με την κλινική εικόνα.

Σπάνια μπορεί να συμβεί εμετός και διάρροια.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

Σκύλος (οι συσκευασίες των 25 mg και 75 mg και 150 mg και 300 mg ανά κάψουλα), γάτα (μόνο η συσκευασία των 25 mg ανά κάψουλα).

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Σκύλοι και Γάτες : Μολυσμένα τραύματα, αποστήματα και λοιμώξεις της στοματικής κοιλότητας και δοντιών: 5,5 mg/kg Σ.Β. κάθε 12 ώρες από το στόμα, για 7 - 10 ημέρες.

Εφ' όσον η κλινική κατάσταση το απαιτεί η θεραπεία στο σκύλο μπορεί να διαρκέσει έως το πολύ για 28 ημέρες. Εάν δεν παρατηρηθεί κλινική ανταπόκριση μέσα σε 4 ημέρες θα πρέπει να αναθεωρείται η διάγνωση.

Με σκοπό την καλύτερη κάλυψη κατά τη διάρκεια επεμβάσεων στα δόντια, συνιστάται η χορήγηση **ANTIROBE** στη δόση των 5,5 mg/kg Σ.Β., κάθε 12 ώρες, για 10 ημέρες. Η θεραπεία αυτή πρέπει να αρχίζει 5 ημέρες προ της επέμβασης στα δόντια και να συνεχίζεται για 5 ημέρες μετά από αυτή.

Σκύλοι

Οστεομυελίτιδα: 11 mg/kg Σ.Β. ανά 12 ώρες από το στόμα και η θεραπεία διαρκεί τουλάχιστον 28 ημέρες. Εάν σε 14 ημέρες δεν επιτευχθούν θεραπευτικά αποτελέσματα τότε η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται και να αναθεωρείται η διάγνωση.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ (5,5 mg/kg Σ.Β. b.i.d.)	ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ * (11 mg/kg Σ.Β. b.i.d)
4,5 kg	1x 25mg Δύο φορές την ημέρα	2 x 25 mg Δύο φορές την ημέρα
13,5 kg	1x75mg* Δύο φορές την ημέρα	1 x 150 mg Δύο φορές την ημέρα
27,0 kg	1x150mg* Δύο φορές την ημέρα	1 x 300 mg Δύο φορές την ημέρα

* μόνο για το σκύλο

ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Από το στόμα.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Έχει διαπιστωθεί ότι η υδροχλωρική κλινδαμυκίνη έχει ανασταλτικές νευρομυϊκές ιδιότητες που μπορούν να ενισχύσουν τη δράση άλλων νευρομυϊκών αναστολέων.

Η χρήση του ANTIROBE σε ζώα στα οποία χορηγούνται νευρομυϊκοί αναστολείς θα πρέπει να γίνεται με προσοχή.

Η Κλινδαμυκίνη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με γλωραμφενικόλη ή μακρολίδια γιατί μπορούν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους το ίδιο σημείο δράσης που είναι η 50S ριβοσωμιακή υποομάδα.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Παρόλο που πειράματα με υψηλές δόσεις Κλινδαμυκίνης σε αρουραίους έδειξαν ότι δεν είναι τερατογόνος και δεν έχει επιπτώσεις στις αναπαραγωγικές ιδιότητες των θηλυκών και αρσενικών εντόμοις η ασφάλεια του προϊόντος στις έγκυες σκύλες ή γάτες δεν έχει μελετηθεί.

ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Η ανώτατη ανεκτή δόση μετά από χορήγηση σε σκύλους από το στόμα ανέρχεται σε 300 mg/kg Σ.Β. Είναι δηλαδή 30 φορές μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη θεραπευτική δόση για τραύματα, αποστήματα και λοιμώξεις της στοματικής κοιλότητας και δοντιών.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η Κλινδαμυκίνη και η ερυθρομυκίνη παρουσιάζουν παράλληλη αντίσταση. Έχει παρατηρηθεί μερική διασταυρωμένη αντίσταση μεταξύ κλινδαμυκίνης, ερυθρομυκίνης και μακρολιδίων αντιβιοτικών.

Σε περιπτώσεις παρατεταμένης θεραπείας πέραν του ενός μηνός πρέπει να ελέγχεται περιοδικά η λειτουργία του ήπατος και των νεφρών και να γίνεται εξέταση αίματος.

Ασθενείς με σοβαρή νεφρική και / ή πολύ σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία που συνοδεύεται από σοβαρή μεταβολική διαταραχή θα πρέπει να θεραπεύονται με προσοχή και θα πρέπει να ελέγχονται αιματολογικά σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας με υψηλές δόσεις κλινδαμυκίνης.

ΦΥΛΑΞΗ

Να φυλάγεται σε θερμοκρασία δωματίου (15° - 25° C).

Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στη συσκευασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί με φιαλίδιο ή blister των 16 ή 80 καψουλών των 25 mg, 75 mg, 150 mg και 300mg

* χορηγείται κατόπιν συνταγής κτηνιάτρου *

ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 77.93.777

Αριθμός Αδείας Κυκλοφορίας : 9410/30-3-1992/Κ-2468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: **Pharmacia & Upjohn 52, Route d' Esch L-1470 Luxemburg**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: **Sanico n.v., 2300 Turnhout, Belgium**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Α': **Sanico n.v., 2300 Turnhout, Belgium**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Β': **VETERIN ABEE**

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: **PFIZER HELLAS AE**

Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα

ΤΗΛ: 210 6785800, FAX:210 6748010

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

31753 /23 -5- 2005, για των 25mg
31754 / 23-5-2005, για των 75mg
31755/ 23-5-2005, για των 150 mg
38670/11-6-2008, για των 300mg