

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

- 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

Pfizer Pfizer Hellas ΑΕ, Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα

ΚΑΚ στην Κύπρο: Pfizer Pfizer Hellas ΑΕ, Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν.

Ψυχικό, Αθήνα

Τοπικός αντιπρόσωπος: VitaTrace Nutrition ΑΕ, 2033 Στρόβολος, Κύπρος,

τηλ: 22 426527

ΑΑΚ: CY029V-E

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

Orion Corporation, Espoo, Finland

- 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**
ANTISEDAN

- 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**
Κάθε ml περιέχει 5mg atipamezole hydrochloride.

- 4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)**

Το Antisedan ενδείκνυται για την αναστροφή της ηρέμησης και της αναλγησίας που επιτυγχάνεται με τη χρήση της μεντετομιδίνης ή της δεξμεντετομιδίνης στο σκύλο και στη γάτα, και για την αναστολή των άλλων ενεργειών της μεντετομιδίνης ή της δεξμεντετομιδίνης, όπως αυτές που προέρχονται από την επίδρασή του στο καρδιαγγειακό και στο αναπνευστικό σύστημα.

- 5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Να μη χρησιμοποιείται σε έγκυα ζώα. Να μη χορηγείται ταυτόχρονα με άλλα φάρμακα τα οποία επιδρούν στο ΚΝΣ, εκτός από εκείνα που περιγράφονται σε αυτό το φύλλο οδηγιών.

- 6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Στο σκύλο παρατηρείται παροδική υπόταση τα πρώτα 10 λεπτά μετά τη χορήγηση. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί έμετος, λαχάνιασμα, αφόδευση και τρομώδεις κινήσεις των μυών (πιθανό ρίγος). Στις γάτες, όταν χρησιμοποιούνται χαμηλές δόσεις Antisedan για την μερική αναστολή της δράσης του Domitor, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αντιμετώπιση τυχόν υποθερμίας (ακόμη και αν έχει αναστραφεί η ηρέμηση.)

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλος, γάτα

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το Antisedan προορίζεται για χρήση στο σκύλο και τη γάτα χορηγείται ενδομυϊκά.

Δοσολογία.

Σκύλοι : Η άριστη δόση του Antisedan εκφρασμένη σε $\mu\text{g}/\text{kg}$ είναι πενταπλάσια της δόσης της μεντετομιδίνης που προηγήθηκε ή δέκα φορές της δόσης της δεξμεντετομιδίνης. Έτσι θα πρέπει να χορηγείται ίση ποσότητα Antisedan με την ποσότητα της μεντετομιδίνης ή δεξμεντετομιδίνης που προηγήθηκε.

Όταν το Domitor έχει χρησιμοποιηθεί στην προαναισθητική αγωγή της γενικής αναισθησίας με θειοπεντόνη-αλοθάνιο, το Antisedan μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετεγχειρητικά για να αναστείλλει την δράση του Domitor και να επιταχύνει την ανάνηψη. Σε αυτή την περίπτωση η άριστη δόση του Antisedan εκφρασμένη σε $\mu\text{g}/\text{kg}$ είναι πενταπλάσια της δόσης του Domitor που προηγήθηκε. Έτσι θα πρέπει να χορηγείται ίση ποσότητα Antisedan με την ποσότητα του Domitor που προηγήθηκε. Η χρήση του Antisedan μετεγχειρητικά επαναφέρει γρήγορα την πλήρη αισθητικότητα στο ζώο, μειώνοντας έτσι σημαντικά την περίοδο της πιθανής καταστολής του καρδιαγγειακού συστήματος και της υποθερμίας.

Γάτες: Η άριστη δόση του Antisedan εκφρασμένη σε $\mu\text{g}/\text{kg}$ είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη της δόσης της μεντετομιδίνης ή 5 φορές τη δόση της δεξμεντετομιδίνης που προηγήθηκε. Έτσι θα πρέπει να χορηγείται η μισή ποσότητα Antisedan σε σχέση με την ποσότητα της μεντετομιδίνης ή της δεξμεντετομιδίνης που προηγήθηκε.

Η δόση του Antisedan εκφρασμένη σε $\mu\text{g}/\text{kg}$ δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το τετραπλάσιο της δόσης του Domitor που προηγήθηκε.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Για την επιτάχυνση της ανάνηψης από την αναισθησία με το συνδυασμό Domitor και κεταμίνης το Antisedan μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δόση των $200\mu\text{g}/\text{kg}$, για να αναστείλλει τη δράση του Domitor. Έτσι θα πρέπει να χορηγείται η μισή ποσότητα Antisedan σε σχέση με την ποσότητα του Domitor που προηγήθηκε.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου προστατευμένο από το φως .

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

Μετά το πρώτο άνοιγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 1 μήνα.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Εξαιτίας της ισχυρής φαρμακολογικής δράσης του Antisedan πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του με το δέρμα και να χρησιμοποιούνται γάντια κατά την χορήγηση του.

**13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

**14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν έχουν παρατηρηθεί αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Πάντως καλό είναι να μην χορηγείται ταυτόχρονα με άλλα φάρμακα τα οποία επιδρούν στο ΚΝΣ, εκτός από εκείνα που

περιγράφονται σε αυτό το φύλλο οδηγιών.

Μετά από υπερδοσία είναι πιθανόν να παρατηρηθεί υπερδιέγερση και ταχυκαρδία. Στις γάτες η υπερδιέγερση αντιμετωπίζεται με τον περιορισμό της έκθεσης του ζώου στα εξωτερικά ερεθίσματα.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

Τηλ. Κέντρου Δηλ. : 210 7793777

ΑΜΚ: 46336/6-12-2000

Γ. Το προϊόν χορηγείται με « ειδική συνταγή ναρκωτικών».