



ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

CIDR® 1.38g Σύστημα Ενδοκολπικής Χορήγησης για Βοοειδή

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Κάθε συσκευή περιέχει Progesterone 1,38g μέσα σε ένα ελαστομερές σιλικόνης από αδρανή νάυλον απόφυση

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Σύστημα Κολπικής Χορήγησης

Συσκευή σχήματος 'T' που αποτελείται από προγεστερόνη εμποτισμένη σε ελαστομερές της σιλικόνης δερματικό επίθεμα Περιβαλλόμενο από αδρανή νάυλον απόφυση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κάθε πακέτο περιέχει 10 συσκευές.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Βοοειδή (αγελάδες και μοσχίδες)

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ, ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Για τον συγχρονισμό του οίστρου σε αγελάδες και μοσχίδες, συμπεριλαμβάνοντας:

- Συγχρονισμός οίστρου σε ομάδες ζώων.

- Συγχρονισμός της δότριας και των ζώων στα οποία θα γίνει μεταφορά εμβρύου.

Να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με προσταγλανδίνη F2α ή συνθετικού αναλόγου. Η χορήγηση όπως προτείνεται , έχει ως αποτέλεσμα τον οίστρο 48-96 ώρες μετά την αφαίρεση της συσκευής, η δε πλειονότητα των ζώων εκδηλώνει οίστρο εντός 48-72 ωρών.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1,38g προγεστερόνης για κάθε ζώο για 7 ημέρες

Για τον Συγχρονισμό του Οίστρου και τον Συγχρονισμό των Δότη και Δέκτη Ζώων για Μεταφορά Εμβρύου

Θα πρέπει να τοποθετείται μία συσκευή στον κόλπο της αγελάδας ή μοσχίδας. Το κολπικό ένθετο, θα πρέπει να παραμείνει στη θέση του για 7 ημέρες. Μια ημέρα πριν την αφαίρεση πρέπει να γίνεται μια ενέσιμη προσταγλανδίνης F2α ή συνθετικού αναλόγου Οίστρος εκδηλώνεται εντός 1-3 ημερών μετά την αφαίρεση του ένθετου. Τεχνητή σπερματέγχυση πρέπει να γίνεται εντός 12 ωρών μετά την εκδήλωση του πρώτου οίστρου.

Χορήγηση

Μια συσκευή εφαρμογής, θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη χορήγηση, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω::

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εφαρμογέας είναι καθαρός και εμβαπτίστηκε σε μη ερεθιστικό αντισηπτικό διάλυμα πριν τη χρήση.
2. Φορέστε αποστειρωμένα πλαστικά γάντια μιας χρήσης, διπλώστε τον « οπλισμό της συσκευής» και βάλτε την στον εφαρμογέα. <Ο οπλισμός της συσκευής.> πρέπει να προεξέχει ελαφρώς από την άκρη του εφαρμογέα. Χρειάζεται προσοχή ώστε να για να αποφευχθεί μη απαραίτητη ή παρατεταμένη χρήση του προϊόντος, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η μεταφορά δραστικής ουσίας στα γάντια του χειριστή.
3. Αλείψτε μικρή ποσότητα γλυσχαντικής ουσίας στην άκρη του «οπλισμένου» εφαρμογέα..
4. Σηκώστε την ουρά και καθαρίστε την περινεϊκή χώρα..
5. Εισάγετε απαλά τον εφαρμογέα στον κόλπο, αρχικώς με κάθετη διεύθυνση και στη συνέχεια οριζοντίως έως ότου αντιληφθείτε κάποια αντίσταση.
6. Σιγουρευτείτε ότι το κορδόνι της αφαίρεσης είναι ελεύθερο, πιέστε το χειριστήριο του εφαρμογέα και επιτρέψτε στον κύλινδρο να μετακινηθεί πίσω προς το χειριστήριο. Αυτό απελευθερώνει τον «οπλισμό» της συσκευής, το οποίο θα διατηρήσει την συσκευή στον πρόσθιο κόλπο.
7. Με τη συσκευή σωστά τοποθετημένη, αφαιρέστε τον εφαρμογέα, αφήνοντας το κορδόνι της αφαίρεσης να κρέμεται από το αιδοίο.
8. Ο εφαρμογέας θα πρέπει να καθαριστεί και να απολυμανθεί πριν χρησιμοποιηθεί σε άλλο ζώο.

Αφαίρεση

Η συσκευή πρέπει να αφαιρεθεί τραβώντας απαλά το κορδόνι. Σε περιπτώσεις που το κορδόνι δεν είναι ορατό έξω από το σώμα του ζώου, μπορεί να εντοπιστεί στον οπίσθιο κόλπο του ζώου, χρησιμοποιώντας ένα δάχτυλο καλυμμένο με γάντι. Η αφαίρεση της συσκευής δεν χρειάζεται δύναμη. Εάν αντιληφθείτε οποια αντίσταση χρησιμοποιήστε το χέρι σας, καλυμμένο με γάντι, για να διευκολύνεται την αφαίρεση. Εάν αντιληφθείτε κάποια αντίσταση χρησιμοποιήστε το χέρι σας, καλυμμένο με γάντι, για να διευκολύνεται την αφαίρεση. Εάν υπάρξει οποια δυσκολία στην αφαίρεση της συσκευής από το ζώο, πέρα από αυτή που αναλύεται παραπάνω, θα πρέπει να συμβουλευτείτε κτηνίατρο.

Η συσκευή προορίζεται για μόνο μία χρήση.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και εντόσθια : 0 ημέρες

Γάλα: 0 μέρες

Κατά την διάρκεια της θεραπείας, το γάλα μπορεί να χρησιμοποιείτε για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε κλινικές μελέτες έχει δείχθει , ότι η χρήση ενδοκολπικών ένθετων συσχετίζεται με κολπικές εκκρίσεις και τοπικός ερεθισμός. Η εξέταση ενδοκολπικών συσκευών μετά από επτά ημέρες τοποθέτηση σε αγελάδες (n=863) έδειξε ότι στο 65% συσκευών βρέθηκε να έχουν θολή ή κίτρινη βλέννη, ενδεικτική για ήπιο τοπικό ερεθισμό και σε 2% των συσκευών βρέθηκε βλέννη που σχετιζόταν με σοβαρό τοπικό ερεθισμό. Γενικά, αυτό το έκκριμα υποχωρεί από την αφαίρεση της συσκευής έως την οχεία/σπερματέγχυσης και δεν επηρεάζεται η μετέπειτα γονιμότητα του ζώου.

ΕΙΔΙΚΗ (ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣ)

Η θεραπεία μόνο με προγεστερόνη, σύμφωνα με τα προτεινόμενα δοσολογικά σχήματα, δεν επαρκεί να προκαλέσει οίστρο και ωογένεση σε θηλυκά ζώα. Είναι προτεινόμενο να επιβεβαιώνεται η κυκλική ωοθηκική δραστηριότητα πριν της χορήγησης θεραπείας με προγεστερόνη. Ζώα σε όχι καλή κατάσταση, είτε από ασθένειες , ανεπαρκή διατροφή ή άλλους παράγοντες μπορεί να αντιδράσουν λίγο στη θεραπεία. Μπορεί να χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της γαλουχίας. Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει τεκμηριωθεί, οπότε να μην το χρησιμοποιείται σε βοοειδή που κυοφορούν ή εντός των πρώτων 35 ημερών μετά τον τοκετό. Εργαστηριακές μελέτες σε επίμους και κονίκλους, μετά από ενδομυϊκές ή υποδόριες χορηγήσεις επαναλαμβανόμενων υψηλών δόσεων προγεστερόνης, έδωσαν ενδείξεις εμβρυοτοξικότητας.

Σημεία κολπικών εκκρίσεων και τοπικός ερεθισμός μπορεί να συνδέεται με τη χρήση ενδοκολπικών ένθετων. Αυτές οι εκκρίσεις γενικών καθαρίζουν μεταξύ του χρόνου αφαίρεσης και σπερματέγχυσης και δεν επηρεάζουν την γονιμότητα των σπερματεγχύσεων που ακολουθούν την θεραπεία.

Κατά το χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος,, κατά τη διάρκεια της εισαγωγής και της αφαίρεσης της συσκευής, θα πρέπει να φοράτε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό που αποτελείται από γάντια. Εισάγετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον εφαρμογή.

Να πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα με σαπούνι και νερό, μετά τη χρήση.

Να μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 30° C.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Κάθε μη χρησιμοποιημένο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή υπολείμματα που προέρχονται από αυτά πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΓΙΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Δικαιούχος σήματος: InterAg, 558 Te Rapa Road, Hamilton, NUEVA ZELANDA

Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα /ΚΑΚ Κύπρου:

Pfizer Hellas AE, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα,

Τηλ: 210 6785800

ΑΜΚ: 26758/21-4-2008

Υπεύθυνος διανομέας στη Κύπρο:

VitaTrace Nutrition Ltd, 20300, Στρόβολος, Κύπρος, τηλ: 22 426527

ΑΑΚ:CY 00125V

Παρασκευαστής Υπεύθυνος για την Απελευθέρωση της παρτίδας στην ΕΕ:

Pfizer Service Company bvba

Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgium

Αριθμός άδειας κυκλοφορίας:

EU/0/00/000/000 TBD

Παρασκευαστής :

DEC International NZ Ltd.

Hamilton, New Zealand

Marketed by:



ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:

International Patents Apply.

©Pfizer is the exclusive licensee of registered trademark CIDR.

L612

39006603-09/07