

## ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

### 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

CLAMOXYL κόνις για πόσιμο διάλυμα

### 2.ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε g σκόνης περιέχει 500 mg amoxycillin ως amoxicillin trihydrate.

### 3. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ , ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Pfizer Hellas AE

Παρασκευαστής: Haupt Pharma Latina Srl  
SS 156 Km 47,600  
04100 Borgo San Michele ( Latina )  
Italy

### 4. ΕΙΔΟΣ – ΣΤΟΧΟΣ

Ορνίθια κρεοπααραγωγής

### 5. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το ClamoxyL κόνις για πόσιμο διάλυμα συνιστάται ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των κολιβακιλλικών λοιμώξεων των κρεοπααραγωγών ορνιθίων που επιπλέκουν δευτερογενώς ιογενείς και μυκοπλασματικές λοιμώξεις.

### 6. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ

Η γενική δοσολογία ανέρχεται σε 20 mg amoxycillin ανά κιλό Σ.Β. ημερησίως.

Η απαιτούμενη ποσότητα φαρμάκου χορηγείται στο πόσιμο νερό, όλη μαζί σε μία ημερήσια δόση που πρέπει να καταναλώνεται σε περιορισμένη χρονική περίοδο π.χ. σε 2-3 ώρες.

Συνιστάται καθημερινή θεραπευτική αγωγή για 3-5 συνεχόμενες ημέρες.

Η απαιτούμενη δόση φαρμάκου που διαλύεται στο νερό υπολογίζεται ως εξής:

$$\text{Ημερήσια δόση} = \frac{\text{Αριθμός πτηνών} \times \text{Μέσος όρος Σ.Β. πτηνών (kg)}}{2500}$$

(σε φιαλίδια)

Αυτό σημαίνει ότι 1 φιαλίδιο είναι αρκετό για τη θεραπεία πτηνών συνολικού βάρους 2500 kg.

### 7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1.Περιορίζουμε την παροχή νερού για δύο ώρες πριν τη χορήγηση.

2.Προσθέτουμε 300 ml νερό σε κάθε φιαλίδιο και το κουνάμε μέχρι να διαλυθεί πλήρως η σκόνη.

3. Ρίχνουμε αμέσως το διάλυμα στη δεξαμενή νερού και ανακατεύουμε απαλά χωρίς να αναδεύουμε τυχόν ίζημα στη δεξαμενή. (Προσοχή: Αν το νερό είναι σκληρό μπορεί να παρατηρηθεί σκούρο χρώμα που όμως δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου)

5. Να μην παρέχετε άλλο νερό εκτός από το φαρμακούχο.

6. Όταν καταναλωθεί όλο το φαρμακούχο νερό, αρχίστε πάλι την παροχή κανονικού νερού.

Πουλιά ηλικίας κάτω των 5 ημερών: Για να βεβαιωθούμε ότι ολόκληρη η ημερήσια δόση θα καταναλωθεί σε μια περιορισμένη χρονική περίοδο χορηγούμε την απαιτούμενη ποσότητα φαρμάκου στο νερό που συνήθως καταναλώνεται προσέχοντας η συγκέντρωση του φαρμάκου στο νερό να είναι ισοδύναμη με 1000ppm (1 φιαλίδιο σε 50 λίτρα νερό).

## **8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Καμιά

## **9. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Να μην χορηγείται σε όρνιθες ωτοκοκίας ή άλλο είδος πτηνών.

Όπως όλες οι πενικιλίνες, η αμοξικιλίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από το στόμα ή παρεντερικά σε κουνέλια, ινδικά χοιρίδια, χάμστερς ή άλλα μικρά τρωκτικά.

Να μην χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ιστορικό υπερευαισθησίας.

## **10. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας.

## **11. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Κρέας: ( ορνίθια κρεοπαραγωγής): 24 ώρες

## **12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Φυλάγεται σε δροσερό περιβάλλον μέχρι 15 °C.

## **13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

1. Μην πιάνετε το φάρμακο με γυμνά χέρια αν έχετε ιστορικό υπερευαισθησίας στις πενικιλίνες.

2. Μην εκτίθεστε στο προϊόν όταν δεν είναι απαραίτητο. Πρέπει να φοράτε αδιαπέραστα ελαστικά γάντια. Μετά την προετοιμασία του διαλύματος να ξεπλένετε αμέσως τυχόν σταγόνες που πετάγονται στα μάτια ή το δέρμα σας. Αποφεύγετε την εισπνοή του φαρμάκου.

3. Αν μετά την έκθεση στο προϊόν έχετε διάφορα συμπτώματα, όπως εξανθήματα στο δέρμα, συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Αν σας πρηστεί το πρόσωπο τα χείλη ή τα μάτια ή έχετε δυσκολία στην αναπνοή (άσθμα) είναι σοβαρά συμπτώματα και πρέπει να βρεθείτε αμέσως κάτω από ιατρική παρακολούθηση.

**14.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ**

Οι μη χρησιμοποιημένοι περιέκτες καθώς και τα υπολείματά τους πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία

**15. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**16 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**Συσκευασία**

Φιαλίδιο των 100gr από πολυαιθυλένιο και 1kg

**Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.**

**Το προϊόν θα διατίθεται μόνο με κτηνιατρική συνταγή.**

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Τηλ. Κέντρου Δηλ.: 210 7793777

ΑΜΚ : 13952/2-3-2005

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν αυτό παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στην:

Pfizer Hellas ΑΕ, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Αθήνα, τηλ: 210 6785800