

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

- 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

Pfizer Hellas ΑΕ, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

Schering-Plough Ltd, Breakspear Road south, Harefield, Uxbridge, Middlesex UB9 6LS, UK

- 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

COOPERTIX

- 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**

Δραστική ουσία :

Cyhalothrin Technical

Έκδοχα:

Volatile Silicone VS 7158

Maize Oil (DE-WAXED) TO

- 4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)**

Κατά των αιματοφάγων και ενοχλητικών μυγών των βοοειδών. Ειδικότερα, το σκεύασμα είναι αποτελεσματικό κατά των παρακάτω αναφερόμενων εξωπαρασίτων:
-Μύγες αιματοφάγες (Haematobia irritans και Stomoxys calcitrans) και ενοχλητικές (Musca spp και Hydrotaea irritans)
- Ψείρες αιματοφάγες (Sollenopotes capillatus, Linognathus vituli και Haematorpinus Eurysternus) και μαλοφάγες (Damalinia bovis).

- 5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση του Coopertix σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα, των οποίων το γάλα προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, ακόμα και κατά τη διάρκεια της ξηράς περιόδου.

- 6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Ελαφρά συμπτώματα δυσφορίας έχουν παρατηρηθεί σε μερικά βοοειδή κατά τις πρώτες 48 ώρες μετά την θεραπεία. Αυτά είναι παροδικά και εν πάσει περιπτώσει χωρίς σοβαρή σημασία για την υγεία των ζώων.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης,, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

- 7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ**

Βοοειδή

- 8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

10ml / ζώο

Ποσότητα φαρμάκου, ίση με μια διαίρεση του ειδικού πάματος-διανομέα, επιχύνεται σ' ένα σημείο της ραχιαίας γραμμής, μεταξύ των ωμοπλάτων, μετά τον διαχωρισμό των τριχών. Προκειμένου για την κεφαλόμυγα, η επίχυση του φαρμάκου γίνεται στη βάση του πίσω μέρους της κεφαλής.

Προκειμένου για τις ψείρες, η θεραπεία επαναλαμβάνεται μετά 6-8 εβδομάδες, ενώ προκειμένου για τις μύγες, αν και η επανάληψη εξαρτάται από τον αριθμό και το είδος των μυγών, συνήθως αυτή γίνεται μετά από 2 εβδομάδες.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Επειδή, σε περίπτωση επαφής του φαρμάκου με το πρόσωπο ορισμένων ατόμων, μπορεί να προκληθεί ένα παροδικό μούδιασμα του δέρματος, συνιστάται όπως οι χειριστές όπως και κάθε άλλο άτομο που έρχεται σε επαφή με τα θεραπευόμενα ζώα, φορούν προστατευτικά γάντια.

Σε περίπτωση λερώματος των ρούχων, αυτά πρέπει να βγαίνουν αμέσως και να πλένονται πριν ξαναχρησιμοποιηθούν. Τυχόν σταγόνες του φαρμάκου πάνω στο δέρμα πρέπει να ξεπλένονται αμέσως με σαπούνη και άφθονο νερό.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας βοοειδών: 3 ημέρες

Γάλα αγελάδας: 0 ημέρες

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε χώρο με θερμοκρασία μικρότερη των 25C και χωριστά από τα τρόφιμα και τα ποτά του ανθρώπου και τις ζωοτροφές.

Διάρκεια ζωής : 5 έτη

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Τα χέρια και το λοιπό εκτεθειμένο δέρμα των χειριστών πρέπει να πλένονται καλά πριν από το κάπνισμα, το φαγητό και μετά από κάθε χρήση του φαρμάκου.

Σε περίπτωση επαφής του φαρμάκου με τον οφθαλμό, συνιστάται το άμεσο πλύσιμό του με άφθονο νερό και η επιζήτηση ιατρικής συμβουλής. Τέλος, σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης πρέπει να ξεπλένεται αμέσως το στόμα και να επιζητείται ιατρική συμβουλή.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

Για κτηνιατρική χρήση μόνο.

Τηλ. Κέντρου Δηλ. ; 210 7793777

