

® **DEPO-MEDROL****ΣΤΕΙΡΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ****ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ****1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan, USA

Παραγωγός : Pharmacia NV/SA, Belgium

Υπεύθυνος κυκλοφορίας: PFIZER HELLAS ΑΕ, Λ. Μεσογείων 243, 154 51,Ν. Ψυχικό, Αθήνα
ΤΗΛ.: 210 6785800**2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**

DEPO – MEDROL

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**Δραστικό(ά) συστατικό(ά) :**

Κάθε ml περιέχει: 40 mg οξικής μεθυλοπρεδνιζολόνης

Έκδοχα:

Polyethylene Glycol 3350 CA 29 mg

MYRISTYL- GAMMA-PICLINIUM-CHLORIDE CA 0.2mg

SODIUM CHLORIDE CA **8.7 mg**

Water for Injection Q.S. AD 1 ml

4. ΕΝΔΕΙΞΗ (ΕΙΣ)

Φλεγμονώδεις και αλλεργικές καταστάσεις.

Ειδικότερα το **DEPO-MEDROL** συνιστάται κατά είδος ζώου ως εξής:**Άλογα:** Τραυματική αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, περιοστίτιδα, τενοντίτιδα, αρθρορογονίτιδα, τενοντοθυλακίτιδα, θυλακίτιδα, μυΐτιδα.**Σκύλοι:** Τραυματική αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, γενικευμένες αρθριτικές καταστάσεις, αλλεργική δερματίτιδα, υγρό και ξηρό έκζεμα, ουρτικάρια, βρογχικό άσθμα και εξωτερική ωτίτιδα.**Γάτες:** Αλλεργική δερματίτιδα, υγρό και ξηρό έκζεμα.Επιπρόσθετα το **Depo-Medrol** συνιστάται παράλληλα με την αντιβιοτική θεραπεία σε περιπτώσεις σοβαροτάτων λοιμώξεων που συνοδεύονται από τοξικά φαινόμενα (πνευμονία, μητρίτιδα) και που απειλούν τη ζωή του ζώου. Συνιστάται επίσης για τις φλεγμονώδεις καταστάσεις των οφθαλμών.**5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Όπως συμβαίνει με όλα τα κορτικοστεροειδή η συστηματική θεραπεία με οξική μεθυλοπρεδνιζολόνη αντενδείκνυται σε ζώα με ενεργό φυματίωση, πεπτικό έλκος και σύνδρομο του Cushing.

Η παρουσία ενεργού φυματίωσης, σακχαρώδους διαβήτου, οστεοπόρωσης, νεφρικής ανεπάρκειας, προδιάθεσης προς θρομβοφλεβίτιδα, υπέρτασης ή συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας επιβάλλει προσεκτικό έλεγχο της χρήσης κορτικοστεροειδών.

Η ενδοθυλακική, η ενδοτενόντιος ή άλλες ενέσεις κορτικοστεροειδών για τοπική ενέργεια αντενδείκνυνται στις περιπτώσεις οξέων λοιμωδών καταστάσεων.

Η έξαρση του πόνου, ο περαιτέρω περιορισμός της κινητικότητας της άρθρωσης, η εμφάνιση πυρετού μετά την ένεση, υποδηλώνουν ότι η κατάσταση πιθανόν να μετατράπηκε σε σηπτική οπότε θα πρέπει να αρχίσει η κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία.

Το **Depo-Medrol** δεν πρέπει να χορηγείται ενδοφλέβια. Επίσης συνιστάται όπως μην αναμιγνύεται με άλλα φάρμακα για ταυτόχρονη χορήγηση στο ίδιο σημείο ενέσεως.**6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Καμμία

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλοι, γάτες, άλογα.

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**Τοπική Εφαρμογή**

Σκύλοι: Η μέση αρχική δόση για μεγάλους θύλακες είναι 20 mg(0,5ml).
Μικρότεροι θύλακες θα απαιτήσουν αντίστοιχα μικρότερη δόση.

Ενδομυϊκή Χορήγηση

Σκύλοι-Γάτες: Η συνιστώμενη ενδομυϊκή δόση για σκύλους και γάτες ανέρχεται σε 1-2 mg/kg ανάλογα με το μέγεθος του ζώου και της σοβαρότητας της κατάστασης. Η θεραπεία επαναλαμβάνεται ανάλογα της κλινικής κατάστασης.

Για θεραπεία συντηρήσεως σε χρόνιες καταστάσεις η αρχική δόση θα πρέπει να μειώνεται βαθμιαία μέχρις ότου επιτευχθεί η μικρότερη δραστική δόση.

9. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας αλόγων στα οποία έγινε θεραπεία με Depo-Medrol να μην δίνεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάγεται σε θερμοκρασία δωματίου. Να μην καταψύχεται.

11. ΕΙΔΙΚΗ (ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣ)

Ζώα στα οποία χορηγούνται κορτικοστεροειδή θα πρέπει να παρακολουθούνται για τυχόν συμπτώματα λοιμώξεως οπότε θα πρέπει να γίνεται η κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία.

Η παρατεταμένη χρήση κορτικοστεροειδών πρέπει να αποφεύγεται.

Αν και το **Depo-Medrol** χορηγούμενο στις συνιστώμενες δόσεις δεν προκαλεί κατάκρτηση νατρίου εντούτοις εάν παρατηρηθούν συμπτώματα υποκαλιαιμίας, η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται και να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση χλωριούχο νάτριο

Στείρο υδατικό εναιώρημα οξικής μεθυλοπρεδνιζολόνης για ενδομυϊκή και ενδοθυλακική έγχυση στους σκύλους και για ενδομυϊκή έγχυση στις γάτες.

* χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου *

Αριθμός Αδείας Κυκλοφορίας: 26495/1-9-1994

ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 210 77.93.777