

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

DOSALID 300 mg.

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας < και παραγωγός:

Pfizer Hellas AE, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

FARMASIERRA SPAIN

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

DOSALID tabs 300 mg.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε δισκίο των 300mg περιέχει 25mg Epsiprantel και 65.4 mg Pyrantel Pamoate.

Έκδοχα:

STARCH MAIZE PREGELATINISED	12 mg
SODIUM LAURYL SULPHATE	0.90 mg
SILICON DIOXIDE COLLOIDAL	2.40 mg
STARCH MAIZE	15 mg
CELLULOSE MICROCRYSTALLINE	60mg
MAGNESIUM STEARATE	1.80 mg
LACTOSE MONOHYDRATE	117.50 mg

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Το Dosalid είναι ένα ευρέως φάσματος ανθελμινθικό για την καταπολέμηση των κεστωδών και των νηματωδών παρασίτων του σκύλου. Έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικό εναντίον των παρακάτω ενήλικων παρασίτων.

Κεστώδη: *Dipylidium caninum*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis* και

Echinococcus granulosus

Νηματώδη

Ασκαρίδες: *Toxocara canis* και *Toxascaris leonina* .

Αγκυλοστόματα: *Uncinaria stenocephala* και *Ancylostoma caninum*

Το Dosalid μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την θεραπεία των παρασιτώσεων.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν υπάρχουν γνωστές

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν υπάρχουν γνωστές

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης,, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλος

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 10,5mg/kg των συνδυασμένων δραστικών συστατικών(5,5 mg/kg επσιπραντέλης και 5mg/kg πυραντέλης).Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός.

Σωμ.Βάρος (kg)	Αρ.δισκίων ανά χορήγηση	
	300 mg	1200 mg
1 - 2	½	-
3 - 4	1	-
5 - 6	1 ½	-
7 - 9	2	½
10- 13	3	1
14 - 18	4	1
19 - 27	-	1 ½
28 - 36	-	2
37 - 46	-	3
πάνω από47	-	4

Κουτάβια

Το Dosalid χορηγείται στα κουτάβια στην ηλικία των 2-4 εβδομάδων και κατόπιν κάθε μήνα μέχρι την ηλικία των 6 μηνών. Σε περιπτώσεις έντονου παρασιτισμού από *T.canis* πιθανόν να είναι απαραίτητη η συνεχόμενη χορήγηση για 2-3 ημέρες

Ενήλικα ζώα

Κάθε 6 μήνες, ή εάν κρίνεται απαραίτητο πιο συχνά για τον έλεγχο των ταινιών(κάθε μήνα)

Σε περιπτώσεις παρασιτισμού από εχινόκοκκο και λόγω της μεγάλης σημασίας του παρασίτου αυτού για την δημόσια υγεία συστήνεται η επανάληψη της θεραπείας μία εβδομάδα αργότερα και στην ίδια δοσολογία.

Θηλυκά ζώα κατά την περίοδο θηλασμού.

Χορηγείται στην αρχή της περιόδου θηλασμού.

Το Dosalid χορηγείται μόνο από το στόμα στους σκύλους.

Δεν χρειάζεται νηστεία πριν από την χορήγηση

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αποφυγή των αναμολύνσεων Για τον λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, να καταπολεμούνται οι ενδιάμεσοι ξενιστές(π.χ. ψύλλοι) και να αποφεύγεται η χορήγηση στα ζώα ωμής τροφής.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες.

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΛΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Καμία

**13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων
φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

**14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ**

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΑΜΚ : 34511/13-9-2000

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν,
παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας
κυκλοφορίας.