

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EQUEST® πόσιμη γέλη, 18,92 mg/g, για άλογα και άλογα πόνου.

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

	Ποσότητα ανά g
<u>Δραστικό συστατικό</u>	
Moxidectin	18,92 mg
<u>Έκδοχα</u>	
Benzyl Alcohol	37,84 mg
Disodium Edetate	0,24 mg

3. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

Pfizer Hellas AE, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800

ΑΜΚ: 70721/10-11-2006

Παρασκευαστής-Συσκευαστής

Fort-Dodge Veterinaria

Vall de Bianya, Ισπανία.

4. ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ

Άλογα και άλογα πόνου.

5. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για τη θεραπεία παρασιτώσεων, που προκαλούνται από ευαίσθητα στη μοξιδεκτίνη στελέχη των παρακάτω παρασίτων.

Μεγάλοι στρόγγυλοι

Strongylus vulgaris (ενήλικα παράσιτα και προνυμφικά στάδια)

Strongylus edentatus (ενήλικα παράσιτα και προνυμφικά στάδια)

Triodontophorus brevicauda (μόνον τα ενήλικα παράσιτα)

Triodontophorus serratus (μόνον τα ενήλικα παράσιτα)

Triodontophorus tenuicollis (μόνον τα ενήλικα παράσιτα)

Μικροί στρόγγυλοι (ενήλικα παράσιτα και προνύμφες εντός των εντερικών κρυπτιών)

Cyathostomum spp.

Cylicocyclus spp.

Cylicostephanus spp.

Cylicodontophorus spp.

Gyalocephalus spp.

Ασκαρίδες

Parascaris equorum (ενήλικα παράσιτα και προνύμφες)

Άλλα είδη παρασίτων

Oxyuris equi (ενήλικα παράσιτα και προνύμφες)

Habronema muscae (μόνον τα ενήλικα παράσιτα)

Gasterophilus intestinalis (μόνον οι προνύμφες L₂ και L₃)

Gasterophilus nasalis (μόνον οι προνύμφες L₂ και L₃)

Strongyloides westeri (μόνον τα ενήλικα παράσιτα)

Trichostrongylus axei

Το προϊόν έχει υπολειμματική δράση κατά των μικρών στρογγύλων για δύο εβδομάδες μετά τη χορήγησή του.

Η αποβολή αυγών μικρών στρογγύλων σταματά για 90 ημέρες.

Το προϊόν είναι αποτελεσματικό κατά των αναπτυσσόμενων ενδοβλεννογόνιων προνυμφών σταδίου L₄ των μικρών στρογγύλων. Επιπλέον, οι υποβιούσες προνύμφες σταδίου L₃ των μικρών στρογγύλων θανατώνονται μέχρι και επί 8 εβδομάδες μετά τη χορήγηση του προϊόντος.

6. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Χορήγηση μοξιδεκτίνης σε δόση 400 µg ανά kg σωματικού βάρους, από το στόμα, μία φορά..

7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χορήγηση από το στόμα.

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Για την επίτευξη της ακριβούς δόσης, τα ζώα να ζυγίζονται ή να μετρώνται με ταινία προσδιορισμού του βάρους.

Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερδοσία, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να χορηγείται η ακριβής δόση σε πουλάρια, ιδιαίτερα μάλιστα σε πουλάρια μικρού σωματικού βάρους ή σε πουλάρια πόνου.

Για τη χορήγηση, η σύριγγα πρέπει να κρατιέται με τέτοιο τρόπο, ώστε το πώμα στο άκρο της να είναι προς τα αριστερά, ώστε να είναι ορατές οι ενδείξεις βάρους του ζώου και οι σημειωμένες ενδείξεις (μικρές μαύρες γραμμές). Κάθε σημειωμένη ένδειξη αντιστοιχεί σε 25 kg σωματικού βάρους. Στρίψτε τον περιστρεφόμενο δακτύλιο, έως ότου η αριστερή πλευρά του δακτυλίου βρεθεί στην ίδια γραμμή με το σωματικό βάρος του ζώου.

Μία σύριγγα επαρκεί για τη χορήγηση σε ένα άλογο βάρους 575.

Να μη χρησιμοποιείται η ίδια σύριγγα για τη θεραπεία περισσότερων του ενός ζώων, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία αυτά ζούν μαζί ή βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους στον ίδιο σταύλο.

9. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χορηγείται σε πουλάρια νεαρότερα από 4 μήνες. Να μη χορηγείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη μοξιδεκτίνη ή σε κάποια άλλη μιλιβεμυκίνη ή σε κάποιο άλλο από τα συστατικά του.

10. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε ιδιαίτερα σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να παρατηρηθούν αταξία, αδιαφορία, κοιλιακός πόνος, μυϊκός τρόμος, πάρεση του κάτω χείλους και οίδημα του ρύγχους. Συνήθως, αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι παροδικές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συμπτώματα αποδράμουν χωρίς ιδιαίτερη θεραπεία.

11. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και σπλάχνα: 32 ημέρες.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη από 25 °C.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Καμία.

14. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Οι κενοί περιέκτες και υπολείμματα του περιεχομένου τους πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατάξεις. Το προϊόν είναι τοξικό για τα ψάρια και τους υδρόβιους οργανισμούς. Υπολείμματα του προϊόντος και υλικά συσκευασίας του, να μην απορρίπτονται σε λίμνες, αρδευτικά κανάλια ή άλλα ρέοντα ύδατα.

15. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

?

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το προϊόν έχει παρασκευασθεί αποκλειστικά για χρήση σε άλογα και άλογα πόνου. Σκύλοι και γάτες μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα εάν καταπιούν γέλη ή εάν γλείψουν μεταχειρισμένες σύριγγες, λόγω της συγκέντρωσης της μοξιδεκτίνης σε αυτό το προϊόν. Σε αυτήν την περίπτωση, έχουν παρατηρηθεί νευρολογικά (όπως αταξία, μυϊκός τρόμος, επιληπτικές κρίσεις) και πεπτικά (όπως υπερβολική σιαλόρροια) κλινικά συμπτώματα.