

ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

FEL-O-VAX IV

Εμβόλιο κατά της Ιογενούς Ρινοτραχειίτιδας,
Καλυκοϊώσης, Πανλευκοπενίας και Χλαμυδίασης

Αδρανοποιημένοι ιοί και chlamydia

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το εμβόλιο Fel-O-Vax IV παρασκευάζεται από τους ιούς feline rhinotracheitis, calici, panleukopenia και τη Chlamydia psittaci που καλλιεργούνται σε κυτταρικές γραμμές γάτας και αδρανοποιούνται με διαδικασία ήπιας αδρανοποίησης, για να διατηρήσουν την αντιγονική τους δύναμη. Το προϊόν περιέχει ένα πολλαπλό ανοσοενισχυτικό σύστημα, για να διεγείρει την ανοσία.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Για κάθε δόση 1 ml:

- Αδρανοποιημένος ιός ρινοτραχειίτιδας της γάτας (FRV)	0.10 ml
- Αδρανοποιημένος καλυκοϊός της γάτας (FCV)	0.05 ml
- Αδρανοποιημένος ιός πανλευκοπενίας της γάτας (FPV)	0.20 ml
- Chlamydia psittaci (στέλεχος Cello)	0.01 ml
- Άλλα συστατικά	q.s1.00 ml

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το εμβόλιο FEL-O-Vax IV ενδείκνυται για τον εμβολιασμό υγιών γατών ηλικίας 8-10 εβδομάδων ή μεγαλύτερης για την προστασία τους από τις ασθένειες που προκαλούν ο ιός της ρινοτραχειίτιδας (herpes virus-1), ο καλυκοϊός, ο ιός της πανλευκοπενίας (panvo) και η Chlamydia psittaci.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν αναφέρονται.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε πολύ μικρό ποσοστό δυνατό να παρατηρηθούν παροδικός πυρετός, έμετος, ανορεξία και/ή κατάπτωση για λιγότερο από 24 ώρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Συνιστάται ο εμβολιασμός υγιών γατών 8 εβδομάδων.
Ενέστε 1 ml ενδομυϊκά ή υποδόρια.

Επαναλάβετε κάθε 3-4 εβδομάδες έως την ηλικία των 16 εβδομάδων.
Συνιστάται ετήσιος επανεμβολιασμός σε μια δόση εμβολίου.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν απαιτείται.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
Σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης χορηγήστε αδρεναλίνη, αντιισταμινικά ή κορτιζόνη.

ΦΥΛΑΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Φυλάξτε σε σκοτεινό χώρο στους 2°-7° C.
Αποφύγετε την κατάψυξη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

24 μήνες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σύριγγα του 1 ml
Κυτίο των 10, 25 και 50 φιαλιδίων του 1 ml έκαστο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΟΙΚΟΣ
FORT DODGE LABORATORIES
FORT DODGE, IRELAND

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ALAPIS ABEE
19300, Ασπρόπυργος, Αττική