

**1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
FEL-O-VAX[®] PCT**

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Δραστικά συστατικά:

INACTIVATED FELINE PANLEUKOPENIA VIRUS	0,20 ml
INACTIVATED FELINE CALICI VIRUS	0,05 ml
INACTIVATED FELINE RHINOTRACHEITIS VIRUS	0,10 ml

Άλλα συστατικά: έως 1 ml

3. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Δικαιούχος:

FORT DODGE LAB. INC.
USA

Παρασκευαστής/υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

Fort Dodge Laboratories Inc. Ireland
Finisklin Industrial Estate, Sligo, Ireland

Υπεύθυνος άδειας κυκλοφορίας:

ALAPIS ABEE
19300 Ασπρόπυργος, Αττική, Ελλάδα
Τηλ.: 210 5575770-3 fax: 210 5575830

4. ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ

Γάτα

5. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Στη γάτα:

-Για την ενεργητική ανοσοποίηση υγιών γατών ηλικίας 8 εβδομάδων ή μεγαλύτερης για την προστασία τους από τις ασθένειες που προκαλούνται από τους ιούς της πανλευκοπενίας, της ρινοτραχειίτιδας και τον καλυκοϊό.

6. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ

Το περιεχόμενο (1 δόση=1ml) μίας προγεμισμένης σύριγγας να ανακινείται καλά και να χορηγείται υποδόρια ή ενδομυϊκά.

Πρώτος εμβολιασμός:

Εμβολιάστε υγιείς γάτες ηλικίας 8 εβδομάδων ή μεγαλύτερες με μία δόση 1 ml, και επανεμβολιάστε με μία δεύτερη δόση 1 ml τρεις ή τέσσερις εβδομάδες αργότερα.

Επαναληπτικός εμβολιασμός:

Ετήσιος εμβολιασμός με μία δόση.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Υποδόρια ή ενδομυϊκή χορήγηση.

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

Σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης, χορηγήστε αδρεναλίνη.

9. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μην εμβολιάζετε άρρωστα / μη υγιή ζώα.

10. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης, χορηγήστε αδρεναλίνη ενδομυϊκά.

Σε οποιοδήποτε ζωικό κεφάλαιο, ενδέχεται μικρός αριθμός ατόμων να μην ανταποκριθεί στον εμβολιασμό.

Σε μικρό ποσοστό γατών είναι δυνατόν μετά τον εμβολιασμό να παρατηρηθεί παροδικός πυρετός και οίδημα στο σημείο της ένεσης, που συνήθως εξαφανίζεται σε 2 ημέρες.

11. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Το προϊόν φυλάσσεται και μεταφέρεται σε σκοτεινό χώρο, θερμοκρασίας +2°C έως +8°C (ψυγείο).

Μην καταψύχετε.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

Προσοχή ώστε η αποστειρωμένη βελόνα να προσαρτάται με άσηπτο τρόπο στην προγεμισμένη σύριγγα.

14. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ

Τα άχρηστα υλικά απορρίπτονται σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

16. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστικές προγεμισμένες σύριγγες των 3 ml που έχουν μία δόση του 1 ml.

A.M.K.

χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου
ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777