

## ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

LINCOCIN FORTE® S

- 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός:

PFIZER HELLAS AE, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα  
Τηλ.: (210) 6785800

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

Pfizer Manufacturing Belgium, NV, Puurs, Belgium

- 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**  
LINCOCIN FORTE® S

- 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**  
Κάθε σύριγγα των 10 ml περιέχει λινκομυκίνη (ως υδροχλωρική) 330 mg και νεομυκίνη (ως θειική) 100 mg.

- 4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)**

Για τη θεραπεία της μαστίτιδας των βοοειδών κατά τη διάρκεια της γαλακτοπαραγωγής. Το προϊόν είναι αποτελεσματικό κατά των στελεχών του *Staphylococcus* (τόσο αυτών που παράγουν όσο και αυτών που δεν παράγουν πενικιλινάση) συμπεριλαμβανομένου του *Staphylococcus aureus*, των στελεχών του *Streptococcus*, συμπεριλαμβανομένων των *Streptococcus dysgalactiae* και *Streptococcus uberis* και των κολιβακίλλων, συμπεριλαμβανομένης της *Escherichia coli*.

- 5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Καμία

- 6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Δεν έχουν αναφερθεί.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

- 7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ**

Αγελάδες κατά τη διάρκεια της γαλακτοπαραγωγής.

- 8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

Δοσολογία: Να γίνει έγχυση μιας σύριγγας (10 ml) σε κάθε προσβεβλημένο τεταρτημόριο. Επαναλάβετε τη θεραπεία αμέσως μετά από κάθε μια από τις επόμενες αμέλξεις (κάθε 12 ώρες), ώστε να γίνουν τρεις εγχύσεις συνολικά σε κάθε μολυσμένο τεταρτημόριο μαστού.

Τρόπος χορήγησης: Χορηγείται μόνο με ενδομαστική έγχυση, υπό συνθήκες ασηψίας.

#### **9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Όταν θεωρείται απαραίτητο, πλύνετε πολύ καλά τις θηλές ή ολόκληρο το μαστό με χλιαρό νερό και κατάλληλο αντισηπτικό και στεγνώστε καλά. Αμείξτε πλήρως το μαστό. Κάνετε αντισηψία στο άκρο της θηλής με τεμάχιο γάζης εμποτισμένο σε οινόπνευμα ή άλλο αντισηπτικό. Χρησιμοποιήστε ξεχωριστό τεμάχιο γάζης για κάθε θηλή. Αφαιρέστε το κάλυμμα από το πλαστικό άκρο της σύριγγας. Διαλέξτε το επιθυμητό μήκος εισόδου (μερικό ή ολόκληρο) και εισάγετε το άκρο της σύριγγας στο θηλαίο πόρο. Σπρώξτε το έμβολο ώστε να αδειάσει όλο το περιεχόμενο της σύριγγας και μαλάξτε το τεταρτημόριο ώστε να διαχυθεί το προϊόν στο γαλακτοφόρο κόλπο. Μετά την έγχυση, συνιστάται όπως βυθίσετε όλες τις θηλές σε κατάλληλο διάλυμα.

#### **10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Κρέας: (αγελάδες): 72 ώρες  
Γάλα: (αγελάδες) : 84 ώρες

#### **11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25° C. Να μην καταψύχεται.

#### **12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)**

Καμία

#### **13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

#### **14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

#### **15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων : (210) 77.93.777

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

