

LINCO-SPECTIN® INJECTABLE

ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Στείρο ενέσιμο διάλυμα λινκομυκίνης και σπεκτινομικίνης.

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

URJOHN BELGIUM

**2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
LINCO-SPECTIN® INJECTABLE**

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

1ml διαλύματος περιέχει:

Υδροχλωρική λινκομυκίνη, ισοδύναμη προς λινκομυκίνη βάση 50 mg.

Θειική σπεκτινομυκίνη ισοδύναμη προς σπεκτινομυκίνη βάση 100 mg.

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Για τη θεραπεία γενικευμένων και εντοπισμένων λοιμώξεων των σκύλων, γάτων, χοίρων, ορνίθων και ινδιάνων που οφείλονται σε στελέχη μικροοργανισμών ευαίσθητων στη LINCO-SPECTIN.

Σκύλοι: Λοιμώξεις του αναπνευστικού, του ουρογεννητικού και του δέρματος. Δευτερογενείς μικροβιακές επιπλοκές, επακόλουθο διαφόρων ιώσεων.

Γάτες: Λοιμώξεις των ανωτέρων αναπνευστικών οδών, του ουροποιητικού, επιμολυσμένα τραύματα, αποστήματα. Δευτερογενείς μικροβιακές επιπλοκές διαφόρων ιώσεων.

Χοίροι: Βακτηριακή και μυκοπλασματική πνευμονία, δυσεντερία των χοίρων, βακτηριακή εντερίτιδα, λοιμώδης αρθρίτιδα.

Νεαρά μοσχάρια: Επιπλέκοντες την ιογενή πνευμονοεντερίτιδα μικροοργανισμοί.

Αίγες-Πρόβατα: Λοιμώδης ποδοδερματίτιδα.

Αναπνευστικές λοιμώξεις που οφείλονται σε μυκόπλασμα και GRAM+βακτηρίδια.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν χορηγείται σε ωτόκες όρνιθες.

Αντενδείκνυται η χορήγηση Lincospectin σε ζώα ή πτηνά ευαίσθητα στη λινκομυκίνη ή τη σπεκτινομυκίνη.

Η λινκομυκίνη είναι τοξική για τους λαγούς, ινδόχοιρους και chinchillas.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Γενικά δεν παρατηρούνται παρενέργειες.

Η χορήγηση Lincospectin σε χοίρους και σε δόσεις υψηλότερες από αυτές που συνιστούνται, ενδέχεται να προκαλέσει παροδική διάρροια ή υδαρή κόπρωνα.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλοι, γάτες, χοίροι, νεαρά μοσχάρια, αίγες, πρόβατα

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Σκύλοι: 1 ml / 5 kg Σ.Β. ενδομυϊκά την ημέρα και μέχρι 21 ημέρες.

Γάτες: 1 ml / 5 kg Σ.Β. μια ή δύο φορές την ημέρα και μέχρι 21 ημέρες.

Χοίροι: 1 ml / 10 kg Σ.Β. μια φορά την ημέρα για 3-7 ημέρες.

Νεαρά μωσχάρια: 1 ml / 10 kg Σ.Β. ενδομυϊκά δύο φορές την πρώτη ημέρα και συνεχίζεται μία φορά την ημέρα για 2-4 ημέρες (το μέγιστο για 3 ημέρες).

Αίγες-Πρόβατα: 1 ml / 10 kg Σ.Β. ενδομυϊκά μία φορά την ημέρα για 3 ημέρες (το μέγιστο για 3 ημέρες).

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Σκύλοι: 1 ml / 5 kg Σ.Β. ενδομυϊκά την ημέρα και μέχρι 21 ημέρες.

Γάτες: 1 ml / 5 kg Σ.Β. μια ή δύο φορές την ημέρα και μέχρι 21 ημέρες.

Χοίροι: 1 ml / 10 kg Σ.Β. μια φορά την ημέρα για 3-7 ημέρες.

Νεαρά μωσχάρια: 1 ml / 10 kg Σ.Β. ενδομυϊκά δύο φορές την πρώτη ημέρα και συνεχίζεται μία φορά την ημέρα για 2-4 ημέρες (το μέγιστο για 3 ημέρες).

Αίγες-Πρόβατα: 1 ml / 10 kg Σ.Β. ενδομυϊκά μία φορά την ημέρα για 3 ημέρες (το μέγιστο για 3 ημέρες).

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας: 14 ημέρες

Γάλα: 2 ημέρες

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Σε χώρο δροσερό και ξηρό προστατευμένο από το φως.

12. ΕΙΔΙΚΗ (ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Να μην υπερβαίνεται ο χρόνος χορήγησης διότι προκαλεί σοβαρά προβλήματα στα μηρυκαστικά.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιαλίδια των 20, 50, 100, 250 και 500 ml.

* χορηγείται με συνταγή κτηνίατρου *

ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 77.93.777

Αριθμός Αδείας Κυκλοφορίας: 9777/16-3-1995/Κ-1760

Δικαιούχος : Pharmacia & Upjohn Company, Kalamazoo, USA

Υπεύθυνος Αδείας Κυκλοφορίας : PFIZER HELLAS AE, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα

Τηλ: 210 6785800