

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

NEO-TERRAMYCIN SOLUBLE POWDER

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας : Pfizer Inc, NY, USA

Παραγωγός υπεύθυνος και για την απελευθέρωση της παρτίδας:

ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, Αυλώνα, Αττικής

Υπεύθυνος άδειας κυκλοφορίας: Pfizer Hellas ΑΕ, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν.

Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

NEO TERRAMYCIN SOLUBLE POWDER

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε 1kg του προϊόντος περιέχει:

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.

ΟΧΥΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ ΗCL(BASED ON A POTENCY

OF 905 MG/G ΟΧΥΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ ΒΑΣΗ ΑΚΤΙΒΙΤΗΤΑ) 60,8gr

ΝΕΟΜΥΣΙΝ ΣΥΛΦΑΤΗ(BASED ON A POTENCY

OF 526MG/GR ΝΕΟΜΥΣΙΝ ΒΑΣΗ ΑΚΤΙΒΙΤΗΤΑ) 73,2gr

ΕΚΔΟΧΑ

TARTARIC ACID 100gr

FD&C YELLOW 6 2,0gr

SUCROSE 764gr

4. ΕΝΔΕΙΞΗ (ΕΙΣ)

Το Neo Terramycin soluble powder ενδείκνυται για τον έλεγχο και την θεραπεία νοσημάτων του αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος των μόσχων, χοίρων, ορνίθων και ινδιάνων

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Να μην χορηγείται το φάρμακο σε όρνιθες κατά την περίοδο της ωοπαραγωγής, τα αυγά των οποίων προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι τετρακυκλίνες κατά την περίοδο ανάπτυξης των οδόντων περιλαμβανομένου και του τελευταίου σταδίου της εγκυμοσύνης προκαλεί δυσχρωματισμό τους.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Μόσχοι, χοίροι, όρνιθες, ινδιάνοι.

7. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

α. Φάκελλος 100gr.

Μόσχοι

Βακτηριακή εντερίτιδα,
ομφαλοφλεβίτιδα,

Πρόληψη

1 φάκελλος ανά 220
λίτρα νερό.

Θεραπεία

2 φάκελλοι ανά
220 λίτρα νερό.

σηψαιμία των νεογνών.

Χοίροι

Βακτηριακή εντερίτιδα,
νεκρωτική εντερίτιδα,
δυσεντερία, σαλμονελλώσεις.

1 φάκελλος ανά 220
λίτρα νερό.

2 φάκελλοι ανά
220 λίτρα νερό

Όρνιθες/Ινδιάνοι

-Λειροκυάνωση(blue comb),
εντερίτιδα, εξαμιτίαση,
πρώωρη θνησιμότητα νεοσσών

1 φάκελλος(5.5g οξυτετρα-
κυκλίνη βάση και 3.85g
νεομυκίνη βάση) ανά
110 λίτρα νερό.

2 φάκ(11g οξυτε
τρακυκλίνη βάση
&7.7g νεομυκίνη
βάση) ανά 110
λίτρα νερό

-Χρόνια αναπνευστική νόσος
(XAN), λοιμώδης κολπίτιδα
ινδιάνων, κόρυζα, χολέρα
πουλερικών.

1 φάκελλος ανά 110 λίτρα
νερό.

2 φάκελλοι ανά
110 λίτρα νερό.

-Βακτηριακή εντερίτιδα,
καταπόνηση, stress λόγω
εμβολιασμών και απότομων
καιρικών μεταβολών.

1 φάκελλος ανά 110 λίτρα
νερό.

2 φάκελλοι ανά
110 λίτρα νερό.

β. φάκελλος 500 γρ.

Μόσχοι

Βακτηριακή εντερίτιδα,
ομφαλοφλεβίτιδα,
σηψαιμία των νεογνών.

Πρόληψη

1 φάκελλος ανά 1100
λίτρα νερό.

Θεραπεία

2 φάκελλοι ανά
1100 λίτρα νερό.

Χοίροι

Βακτηριακή εντερίτιδα,
νεκρωτική εντερίτιδα,
δυσεντερία, σαλμονελλώσεις.

1 φάκελλος ανά 1100
λίτρα νερό.

2 φάκελλοι ανά
1100 λίτρα νερό

Όρνιθες/ Ινδιάνοι

-Λειροκυάνωση(blue comb),
εντερίτιδα, εξαμιτίαση,
πρώωρη θνησιμότητα νεοσσών

1 φάκ(27.5g οξυτετρα-
κυκλίνη βάση & 19.25g
νεομυκίνη βάση) ανά
550 λίτρα νερό.

2 φάκ(55g οξυτε-
τρακυκλίνη βάση
&38.5g νεομυκίνη
βάση ανά 550
λίτρα νερό.

-Χρόνια αναπνευστική νόσος
(XAN), λοιμώδης κολπίτιδα

1 φάκελλος ανά 550 λίτρα
νερό.

2 φάκελλοι ανά
550 λίτρα νερό.

ινδιάνων, κόρυζα, χολέρα
πουλερικών.

-Βακτηριακή εντερίτιδα, καταπόνηση, stress λόγω εμβολιασμών και απότομων καιρικών μεταβολών	1 φάκελλος ανά 550 λίτρα νερό.	2 φάκελλοι ανά 550 λίτρα νερό.
--	-----------------------------------	-----------------------------------

9. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Τα ζώα να μην σφάζονται και το κρέας τους να μη διατίθεται στην κατανάλωση πριν περάσουν τα πιο κάτω χρονικά διαστήματα από την τελευταία χορήγηση του φαρμάκου.

Μόσχοι:	7 ημέρες
Χοίροι :	5 ημέρες
Ορνίθια κρεατοπαραγωγής:	5 ημέρες
Ορνιθες ωοπαραγωγής:	14 ημέρες
Ινδιάνοι:	14 ημέρες

10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε χώρο ξηρό και δροσερό.

11.ΕΙΔΙΚΗ (ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣ)

Δεν εφαρμόζεται.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Δεν εφαρμόζεται.

Να χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή.

Να φυλάγεται μακριά από τα παιδιά.

Τηλ. Κέντρου Δηλ:210 7793777

ΆΜΚ : 14400/14-5-92