

**ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**  
**ORBENIN DC**

**Υπεύθυνος Άδειας Κυκλοφορίας**

Pfizer Hellas AE, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800

**Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:**

Pfizer Inc, NY, USA

**Σύνθεση**

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.

CLOXACILLIN BENZATHINE 500MG

ΕΚΔΟΧΑ

MINERAL OIL BASE q.s. 3,0gr

**Σύνθεση του mineral oil:**

STEARIC ACID 0,8078%

ALUMINIUM STEARATE 3,0699w/w

LIQUID PARAFFIN 96,1223w/w

**Φαρμακευτική Μορφή**

Εναιώρημα για ενδομαστική χορήγηση ( κατά την έναρξη της ξηράς περιόδου )

**Είδος ζώου**

Αγελάδες

**Ενδείξεις για χρήση**

Πρόληψη μαστίτιδας κατά τη διάρκεια της ξηράς περιόδου. Το ORBENIN DC χρησιμοποιείται ειδικά στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής την στιγμή που διακόπτεται η παραγωγή γάλακτος και αρχίζει η ξηρά περίοδος, δηλ. αμέσως μετά το τελευταίο άρμεγμα.

**Δοσολογία και μέθοδος χορήγησης**

Χορηγείται ενδομαστικά μία σύριγγα για κάθε τεταρτημόριο του μαστού, μετά το τελευταίο άρμεγμα, στο τέλος της γαλακτικής περιόδου.

**Ειδικές Προειδοποιήσεις στη Χορήγηση**

Πριν την χορήγηση του φαρμάκου, η θηλή πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά και να γίνεται αντισηψία με το ειδικό αντισηπτικό χαρτομάνδηλο που υπάρχει μέσα στη συσκευασία.

### **Αντενδείξεις, Ειδικές προφυλάξεις**

Επειδή ο χρόνος δράσης του ιδιοσκευάσματος παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ORBENIN DC δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου η ξηρά περίοδος των αγελάδων είναι μικρή μικρότερη των 28 ημερών.

### **Ανεπιθύμητες ενέργειες**

Δεν υπάρχουν γνωστές

### **Ειδικές Προφυλάξεις για τη Χρήση**

Οι πενικιλίνες και οι κεφαλοσπορίνες μπορούν να προκαλέσουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας ( αλλεργία), ύστερα από έγχυση εισπνοή, ή κατάποση ή επαφή με το δέρμα. Υπερευαισθησία στις πενικιλίνες μπορεί να οδηγήσει σε διασταυρωμένες αντιδράσεις με κεφαλοσπορίνες και το αντίθετο.

### **Χρόνος Αναμονής**

**Αγελάδες ( Κρέας ) : 0 ημέρες**

**( Γάλα ) : 28 ημέρες**

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την θεραπεία των μαστίτιδων των αγελάδων κατά τη γαλακτική περίοδο. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται τις τελευταίες 28 ημέρες πριν από τον τοκετό. Αν ο τοκετός συμβεί σε διάστημα μικρότερο των 28 ημερών μετά τη χορήγηση, το γάλα μπορεί να δοθεί στην κατανάλωση αφού παρέλθουν 31 ημέρες από την χορήγηση του φαρμάκου.

### **Ειδικά Μέτρα Προφύλαξης για την Απόρριψη Προϊόντος που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή απορριμμάτων.**

Η απόρριψη προϊόντος που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή των αχρήστων υλικών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

### **Γενικές Προφυλάξεις**

Μόνο για κτηνιατρική χρήση.  
Να πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.

### **Ειδικές Προφυλάξεις κατά την Αποθήκευση**

Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος.

### **12.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Κουτί 24 συρίγγων των 3gr και 24 αντισηπτικά χαρτομάνδηλα.

Χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή

**\*ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ\***  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 31772/23-5-2005

Ημερομηνία αναθεώρησης:  
Παρασκευαστής: Pfizer Italia S.r.l. Latina, Italy