

Χορήγηση: Στο τέλος της γαλακτικής περιόδου ο μαστός θα πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται και θα πρέπει να στεγνώσει πριν την έγχυση καθώς αυτό κρίνεται απαραίτητο αφού το Orbeseal δεν διαθέτει αντιμικροβιακή δράση. Προσοχή θα πρέπει να δίνεται επίσης και στο να αποφύγουμε την μόλυνση του στομίου της σύριγγας.

Εισάγεται το στόμιο μέσα στη θηλή και με ήπια και συνεχή πίεση αδειάζουμε το περιεχόμενο.

Μην εκτελείται μασάζ στη θηλή ή στο μαστό μετά την χορήγηση του προϊόντος.

Ενδείκνυται μετά την έγχυση του προϊόντος να ακολουθεί απολύμανση της θηλής.

Παρουσίαση απλών σταδίων για την αποφυγή ανάπτυξης λοιμώξεων κατά την διάρκεια της χορήγησης

- 1.Κρατείστε την σύριγγα καθαρή και ΜΗΝ ανακατέψετε το περιεχόμενό της με νερό.
- 2.Αρχίζουμε με καθαρισμό και απολύμανση των θηλών με ειδικά χαρτομάνδηλα εμποτισμένα σε αλκοόλη , που επιτρέπουν τον άμεσο καθαρισμό και το στέγνωμα της περιοχής πριν την έγχυση.
- 3.Καθαρείστε πρώτα τις δύο θηλές που βρίσκονται από την αντίθετη προς εσάς πλευρά του ζώου και μετά τις δύο που βρίσκονται προς την δική σας πλευρά.
4. Σιγουρευτείτε ότι οι θηλές είναι στεγνές πριν την χορήγηση.
- 5.Εισάγετε το προϊόν στις θηλές με την αντίθετη σειρά από αυτήν που τις καθαρίσατε. Δηλ. πρώτα τις δύο που βρίσκονται προς την δική σας πλευρά και μετά τις δύο που βρίσκονται στην αντίθετη από την δική σας.
- 6.Μετά την εισαγωγή του προϊόντος απολυμάνετε τις θηλές με χειρουργικό οινόπνευμα ή με ειδικά χαρτομάνδηλα εμποτισμένα σε αλκοόλη και αφήστε τις αγελάδες να σταθούν όρθιες για τουλάχιστον μισή ώρα επιτρέποντας το θηλαίο πόρο να κλείσει.
- 7.ΜΗΝ κάνετε μασάζ στη θηλή ή τον μαστό μετά την θεραπεία.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση:

Μια καλή πρακτική είναι να ελέγχονται για μαστίτιδα, οι αγελάδες που εισέρχονται σε ξηρά περίοδο. Εφόσον ένα τεταρτημόριο του μαστού αναπτύξει κλινική μαστίτιδα, το πώμα θα πρέπει να απομακρυνθεί με το χέρι, πριν να αρχίσει η απαιτούμενη θεραπεία.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο της μόλυνσης , μην βυθίζετε την σύριγγα μέσα στο νερό.

Χρησιμοποιείτε τη σύριγγα μόνο μια φορά.

Να μην ακολουθεί καμμία άλλη χορήγηση ενδομαστικού προϊόντος μετά την χορήγηση του Orbeseal.

Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία:

Το *Orbeseal* δεν θα πρέπει να χορηγείται στη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου.

Εάν εξ'ατυχήματος, χρησιμοποιηθεί σε αγελάδα που βρίσκεται σε γαλακτοπαραγωγή, μπορεί να παρατηρηθεί, μια μικρή (έως και διπλάσια) παροδική αύξηση των σωματικών κυττάρων .

Εφόσον συμβεί αυτό, το πώμα θα πρέπει να αφαιρείται με το χέρι, χωρίς να χρειάζεται κάποια άλλη προφύλαξη.

Καθώς το *Orbeseal* είναι ένα προϊόν που δεν απορροφάται μετά από ενδομαστική έγχυση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έγκυα ζώα .
Η κατάποση του πώματος από το νεογέννητο μόσχο είναι ασφαλής και δεν προκαλεί καμιά ανεπιθύμητη ενέργεια.

8. Χρόνος(οι) αναμονής

Κρέας : Μηδέν ημέρες

Γάλα : Μηδέν ημέρες

9. Ειδικές συνθήκες φύλαξης

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό προϊόν

10.Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε αγελάδες οι οποίες είναι ύποπτες ή διαπιστωμένα πάσχουν από μαστίτιδα κατά το τέλος της γαλακτοπαραγωγής.

Όπως επιβάλλεται σε όλες τις θεραπείες που εφαρμόζονται στις μαστίτιδες ξηράς περιόδου, είναι καλή πρακτική να παρατηρούνται οι αγελάδες που βρίσκονται σε ξηρά περίοδο για την εμφάνιση συμπτωμάτων κλινικών μαστίτιδων.

Εφόσον ένα τεταρτημόριο του μαστού στο οποίο έχει εφαρμοστεί *Orbeseal* αναπτύξει κλινική μαστίτιδα, το περιεχόμενο του προσβεβλημένου τεταρτημορίου θα πρέπει να απομακρυνθεί με το χέρι, πριν την θεραπεία.

Μην το χρησιμοποιήσετε σε αγελάδες οι οποίες βρίσκονται σε γαλακτική περίοδο. Εφόσον χορηγηθεί εξ' ατυχήματος σε ζώο που βρίσκεται σε γαλακτοπαραγωγή, θα πρέπει να αδειάσει το περιεχόμενο με το χέρι και καμιά άλλη προφύλαξη δεν χρειάζεται.

Κατά τον τοκετό θα πρέπει να αφαιρείται το περιεχόμενο από κάθε θηλή με χαρτομάνδηλο το οποίο θα απορρίπτεται

11. Ειδικές προφυλάξεις για την απόρριψη του αχρησιμοποίητου προϊόντος

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

Κρατείστε το μακριά από τα παιδιά.

Αποθηκεύστε το σε θερμοκρασία 25°C.

ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

Χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή

Τηλ. Κέντρου Δηλ.: 210 7793777

Δικαιούχος :

Pfizer Limited,
Ramsgate Road,
Sandwich,
Kent CT13 9NJ,
UK

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Pfizer Hellas AE, Λ. Μεσογείων 243,

154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα

τηλ: 210 6785800

