

ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Pathozone 100

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ (Α) ΚΑΙ ΑΛΛΟ (Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ (Α)

Το Pathozone 100 είναι ενδομαστικό εναιώρημα το οποίο περιέχει 105.6 mg cefoperazone dihydrate ανά σύριγγα των 10 ml.

3. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Παρασκευαστής: Pfizer Italia s.r.l, Borgo san Michele, Latina, Italy

Συσκευαστής: Pfizer Italia s.r.l, Borgo san Michele, Latina, Italy

Σημείο απελευθέρωσης της παρτίδας: Pfizer Italia s.r.l, Borgo san Michele, Latina, Italy

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: Pfizer HELLAS ΑΕ, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : Pfizer Inc USA

4. ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ

Αγελάδες οι οποίες βρίσκονται στην γαλακτοπαραγωγική περίοδο.

5. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Θεραπεία των κλινικών μαστίτιδων των αγελάδων κατά την γαλακτοπαραγωγική περίοδο. Οι κλινικές μαστίτιδες που προκαλούνται από ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων και των παθογόνων που αναφέρονται παρακάτω, έχει αποδειχθεί ότι ανταποκρίνεται στην θεραπεία με κεφοπεραζόνη.

-*Streptococcus agalactiae*

-*Streptococcus dysgalactiae*

-*Streptococcus uberis*

-*Staphylococcus aureus* (συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών που παράγουν πενικιλινάση)

-*Escherichia coli*

6. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ

Στον προσβεβλημένο μαστό χορηγείται μία σύριγγα. Η θεραπεία επαναλαμβάνεται μετά από 24 ώρες.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ (ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το προϊόν πρέπει να ανακινείται πριν την χρήση. Στην συνέχεια στον προσβεβλημένο μαστό χορηγείται μία σύριγγα.

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Πριν την χορήγηση του φαρμάκου, η θηλή πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται με το ειδικό αντισηπτικό χαρτομάνδηλο που υπάρχει μέσα στη συσκευασία. Μετά την χορήγηση του φαρμάκου, η θηλή και ο μαστός πρέπει να μαλάζονται για καλύτερη διασπορά του προϊόντος.

9.ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην χορηγείται σε ζώα τα οποία είναι γνωστό ότι παρουσιάζουν αλλεργική αντίδραση στις κεφαλοσπορίνες καθώς και σε ζώα με σοβαρή διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας.

10. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν έχουν παρατηρηθεί.

11. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Εδώδιμοι ιστοί: 2 ημέρες μετά την δεύτερη χορήγηση.

Γάλα: 4 ημέρες μετά την δεύτερη χορήγηση.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες 15-25 βαθμών Κελσίου.

13. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Καμία

14. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Τυχόν αχρησιμοποίητο προϊόν θα πρέπει να καταστρέφεται ασφαλώς σε κλίβανο.

Το γάλα των ζώων που έχουν θεραπευθεί με το Pathozone 100 θα πρέπει να χύνεται.

15. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας

Τηλ. Κέντρου Δηλ.: 210 7793777