

ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Synulox LC ,Ενδομαστικό εναιώρημα

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ (Α) ΚΑΙ ΑΛΛΟ (Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ (Α)

Κάθε σύριγγα 3g του προϊόντος περιέχει.

Amoxicillin as amoxicillin trihydrate Ph.Eur. 200mg

Clavulanic acid as potassium clavulanate 50 mg

Prednisolone Ph.Eur. 10mg

Έκδοχα

Calcium sodium aluminosilicate 300mg

Paraffin base έως 3g

3. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Παρασκευαστής: Pfizer Italia S.r.l,
Borgo San Michele (LT) ss 156Km 50Latina, Italy

Δικαιούχος σήματος : Pfizer Inc, NY, USA

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: Pfizer Hellas AE, Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό,
Αθήνα, τηλ: 210 6785800

4. ΕΙΔΟΣ (Η) ΖΩΟΥ (ΩΝ)

Αγελάδες οι οποίες βρίσκονται στην γαλακτοπαραγωγική περίοδο.

5. ΕΝΔΕΙΞΗ (ΕΙΣ)

Το Synulox LC ενδείκνυται για την θεραπεία των μαστίτιδων των αγελάδων κατά την γαλακτοπαραγωγική περίοδο. Έχει σημαντική ευρέος φάσματος βακτηριοκτόνο δράση κατά των βακτηρίων που συνήθως απομονώνονται από τον μαστό των αγελάδων.

Κλινικά το Synulox LC έχει αποδειχθεί, ότι είναι αποτελεσματικό στην καταπολέμηση των μαστίτιδων που προκαλούνται από τα κατωτέρω σημαντικά παθογόνα.

Staphylococci (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών που παράγουν β-λακταμάσες)

Streptococci (συμπεριλαμβανομένων των *S.agalactine*,*S.dysgalactine*,*S.uberis*)

E.coli (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών που παράγουν β-λακταμάσες)

6.ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ

Η θεραπεία περιλαμβάνει την έγχυση 3 συριγγων σε κάθε προσβεβλημένο τεταρτημόριο (μία σύριγγα κάθε 12 ώρες)

7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Αφού αμελχθεί ο μαστός και γίνει αντισηψία στη θηλή, εισάγεται το ρύγχος της σύριγγας στη θηλή και εφαρμόζεται ελαφρά πίεση έως ότου αδειάσει η σύριγγα. Ο

μαστός στον οποίο έγινε θεραπεία πρέπει να αμέλγεται στην επόμενη άμελξη και το γάλα να απορρίπτεται.

8.ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Καμμία

9. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ιστορικό υπερευαισθησίας

10. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας

11. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας (αγελάδες) : 3 ημέρες

Γάλα (αγελάδες) : 72 ώρες, μετά το τελευταίο άρμεγμα

12.ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25C στην αρχική συσκευασία.

13.ΕΙΔΙΚΗ (ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣ)

Οι πενικιλίνες και οι κεφαλοσπορίνες μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αλλεργία), σε ευαίσθητα άτομα μετά από ένεση, εισπνοή, κατάποση, ή επαφή με το δέρμα. Η υπερευαισθησία στις πενικιλίνες μπορεί να οδηγήσει σε διασταυρούμενη αντίδραση στις κεφαλοσπορίνες και αντιστρόφως. Αυτές οι αλλεργικές αντιδράσεις μερικές φορές μπορεί να είναι σοβαρές.

1.Σε περίπτωση που ο χρήστης γνωρίζει ότι είναι ευαίσθητος στις πενικιλίνες, πρέπει να χειρίζεται το προϊόν με προσοχή ώστε να αποφύγει την έκθεση σε αυτό.

2.Εάν μετά την έκθεση στο προϊόν αναπτυχθούν συμπτώματα όπως φλεγμονή στο δέρμα πρέπει να αναζητηθεί ιατρική συμβουλή και να ενημερωθεί ο ιατρός για την επαφή με το προϊόν.Οίδημα στο πρόσωπο, στα χείλη στα μάτια ή δυσκολία στην αναπνοή είναι πιο σοβαρά συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική βοήθεια.

14. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ

Οι μη χρησιμοποιημένοι περιέκτες καθώς και τα υπολείματά τους πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

15. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

16. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συσκευασία

Κουτί 12 συρίγγων από πολυαιθυλένιο των 3g

Κουτί 24 συρίγγων από πολυαιθυλένιο των 3g

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες

ΑΜΚ: 13627/1-3-2005

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων.: 210 7793777