

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

TERRAMYCIN – 100 INJECTABLE SOLUTION

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας : Pfizer Inc, NY, USA
Παραγωγός υπεύθυνος και για την απελευθέρωση της παρτίδας:
Pfizer PGM, Zone Industrielle-9 routes des industries 37530 Poce sur Cisse

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ TERRAMYCIN-100 INJECTABLE SOLUTION

3. ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε 1 ml του προϊόντος περιέχει.

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.

ΟΧΥΤETRACYCLINE HYDROCHLORIDE 108.15mg

NON STERILE VETERINARY INJECTABLE

GRADE(active ingredient)

ΕΚΔΟΧΑ

POLYVINYLPIRROLIDONE P.V.P -K17 175.000

MAGNESIUM OXIDE 8.82

Magnesium Form. Sulfoxylate I- Cl- 012-3 4.00

Monoethanolamine 18.50

WATER FOR INJECTION(vehicle) 767.53

4.ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

-Βοοειδή: Αναπλάσμωση ,άνθρακας, διφθερίτιδα, βακτηριακή εντερίτιδα, ποδοδερματίτιδα, λεπτοσπείρωση, μητρίτιδα, πνευμονία, πυρετό μεταφοράς, μολυσματικά τραύματα, μαστίτιδα, ομφαλοφλεβίτιδα.

-Χοίροι :Βακτηριακή εντερίτιδα, ερυσίπελας, λεπτοσπείρωση, μητρίτιδα, πνευμονία , πρόληψη και θεραπεία της διάρροιας των θηλαζόντων χοιριδίων με παρεντερική χορήγηση στις χοιρομητέρες κατά την περίοδο του θηλασμού, μολυσματικά τραύματα.

-Αίγες, πρόβατα : Βακτηριακή εντερίτιδα, πνευμονία, αιμορραγική σηψαιμία, λοιμώδη ποδοδερματίτιδα, ομφαλοφλεβίτιδα των αμνών, σηπτικές μητρίτιδες, μαστίτιδες, μολυσματικά τραύματα γενικά.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μην προβαίνετε σε χορήγηση του φαρμάκου στους σκύλους.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι τετρακυκλίνες κατά την περίοδο ανάπτυξης των οδόντων περιλαμβανομένου και του τελευταίου σταδίου της εγκυμοσύνης προκαλούν δυσχρωματισμό τους.

Είναι δυνατόν να υπάρχουν μερικές τοπικές αντιδράσεις που εκδηλώνονται με παροδικό οίδημα και υπεραιμία στο σημείο της ένεσης.

Αντιδράσεις αναφυλαξίας ή αλλεργικής φύσεως συμβαίνουν σπάνια σε υπερευαίσθητα ζώα. Με την πρώτη ένδειξη αντίδρασης διακόψατε την χρήση του φαρμάκου και χορηγήσατε επινεφρίνη σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Το φάρμακο γενικά ενδείκνυται για την θεραπεία λοιμώξεων του πεπτικού, αναπνευστικού και ουρογεννητικού συστήματος ως και σηψαιμιών των βοοειδών χοίρων και αιγοπροβάτων.

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

<u>Είδος ζώου</u>	<u>Κατά προσέγγιση δόση ml</u>	<u>mg/kg/ημέρα</u>	<u>οδός χορήγησης</u>
Βοοειδή	7.5-15	2-5	ενδοφλέβια, ενδομυικά
Μόσχοι	1-3	2-5	
Αίγες πρόβατα	1.5-6	2-7	ενδοφλέβια, ενδο- μυικά, υποδόρια
Αμνοερίφια	0.25-2	2-7	
Χοίροι	3-10	2-9	ενδοφλέβια, ενδο- μυικά, υποδόρια
Χοιρίδια	0.5-1	2-9	

Οι δόσεις του φαρμάκου ποικίλλουν ανάλογα με την σοβαρότητα της ασθένειας και κυμαίνονται από 2-10 mg δραστικής Terramycin ανά κιλό σωμα. βάρους. Προληπτικά και για ελαφρές παθήσεις μπορούν να χορηγηθούν 2mg ανά κιλό σωμα. βάρους.

Θεραπευτικά και για σοβαρές περιπτώσεις 10mg ανά κιλό σωμα. βάρους. Στις περισσότερες περιπτώσεις μια εμφανής βελτίωση σημειώνεται μετά από 36-48 ώρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πιο πάνω δόσεις μπορούν να περιοριστούν, αλλά ποτέ δεν πρέπει να είναι κάτω των 2 ή πιο πάνω από 10mg ανά κιλό σωμα. βάρους.

ΟΔΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η Terramycin 100 μπορεί να χορηγηθεί:

1. Ενδομυικά σε όλα τα μεγάλα ζώα μέσα στις μυϊκές μάζες των πίσω άκρων. Ανάλογα με το μέγεθος του ζώου χρησιμοποιούμε βελόνη μήκους από 2.5-5cm και ανάλογου διαμετρήματος.
2. Υποδόρια στους χοίρους στις ζώνες όπου υπάρχει αφθονία λιπώδους ιστού αμέσως κάτω από το δέρμα.
3. Δια της ενδομητρίου οδού δια πλύσεων μετά τον τοκετό αγελάδων.
4. Τοπικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιδέσεις τραυμάτων, εξελκώσεων κλπ

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

- α) Το κρέας των βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων πρέπει να διατίθεται 5 ημέρες μετά την τελευταία χορήγηση του φαρμάκου.
- β) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του γάλακτος που προέρχεται από ζώα που υποβλήθηκαν σε θεραπεία, πριν περάσουν 60 ώρες από την τελευταία χορήγηση.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε δροσερό χώρο, σε θερμοκρασία 3-15οC. Το προϊόν μπορεί να λάβει σκούρα εμφάνιση, αυτό όμως δεν μειώνει την δραστηριότητά του.

12. ΕΙΔΙΚΗ (ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Να πλένονται τα χέρια του χρήστη μετά την χρήση.

Μην αναταράσσεται το φάρμακο προς αποφυγή αφρού.

Μην υπερβαίνεται τις συνιστώμενες δόσεις.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΆΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Δεν εφαρμόζεται

Να χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή.

Να φυλάγεται μακριά από τα παιδιά.

Τηλ. Κέντρου Δηλ. 2107793777

ΑΜΚ: 24598/93/11-5-1994