

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

TERRAMYCIN-50 INJECTABLE SOLUTION

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας : Pfizer Inc, NY, USA
Παραγωγός υπεύθυνος και για την απελευθέρωση της παρτίδας:
Pfizer PGM, Zone Industrielle-9 routes des industries 37530 Poce sur Cisse,
AMBOISE, FRANCE

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

TERRAMYCIN-50 INJECTABLE SOLUTION

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ (Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Ανά μονάδα δόσης mg/ml

Δραστικές ουσίες

Oxytetracycline hydrochloride 56.410mg

Εκδόχα

Magnesium chloride hexahydrate 31.231

Water for injection περίπου 181.678

Monoethanolamine περίπου 24.527

Propylene glycol 778.154

Sodium formaldehyde sulfoxylate 5.200

4. ΕΝΔΕΙΞΗ (ΕΙΣ)

-Βοοειδή: Αναπλάσμωση, άνθρακας, διφθερίτιδα, βακτηριακή εντερίτιδα, ποδοδερμίτιδα, λεπτοσπείρωση, μητρίτιδα, πνευμονία, πυρετό μεταφοράς, μολυσματικά τραύματα, μαστίτιδα, ομφαλοφλεβίτιδα.

-Χοίροι: Βακτηριακή εντερίτιδα, ερυσίπελας, λεπτοσπείρωση, μητρίτιδα, πνευμονία, πρόληψη και θεραπεία της διάρροιας των θηλαζόντων χοιριδίων με παρεντερική χορήγηση στις χοιρομητέρες κατά την περίοδο του θηλασμού, μολυσματικά τραύματα.

-Αίγες, πρόβατα: Βακτηριακή εντερίτιδα, πνευμονία, αιμορραγική σηψαιμία, λοιμώδη ποδοδερμίτιδα, ομφαλοφλεβίτιδα, μητρίτιδες, μαστίτιδες, ευνουχισμοί και τραύματα γενικά.

-Πουλερικά (κρεατοπαραγωγής, ωοπαραγωγής, αναπαραγωγής, ινδιάνοι): Χρόνια αναπνευστική νόσος (*AN, AIP-ΣΑΚ ή CRD), κόρυζα, πανώλη πουλερικών, μολυσματική συνοβίτιδα, μετωπιαία μολυσματική κολπίτιδα ινδιάνων.

-Σκύλοι / Γάτες: Λοιμώξεις του αναπνευστικού, πεπτικού. ουρογεννητικού συστήματος και γενικώς επί λοιμώξεων που οφείλονται σε μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην δράση της οξυτετρακυκλίνης.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

α. Μην προβαίνετε σε χορήγηση του φαρμάκου στις ωτόκες όρνιθες, εκτός εάν τα αυγά τους προορίζονται για εκκόλαψη.

β. Η ενδοφλέβια χορήγηση στους σκύλους μπορεί να προκαλέσει πτώση της πίεσεως του αίματος και για αυτό να αποφεύγεται.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

α. Μην προβαίνετε σε χορήγηση του φαρμάκου στις ωτόκες όρνιθες, εκτός εάν τα αυγά τους προορίζονται για εκκόλαψη.

β. Η ενδοφλέβια χορήγηση στους σκύλους μπορεί να προκαλέσει πτώση της πίεσεως του αίματος και για αυτό να αποφεύγεται.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Βοοειδή, χοίροι, αίγες, πρόβατα, πουλερικά, σκύλοι, γάτες.

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ (ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Βοοειδή	15-30	2-5	ενδοφλέβια, ενδο- μυϊκά, υποδόρια, ενδοπεριτοναϊκά
Μόσχοι	2-6		
<hr/>			
Αίγες, πρόβατα	3-12	2-7	ενδοφλέβια, ενδο- μυϊκά, υποδόρια ενδοπεριτοναϊκά
Αμνοί, ερίφια	0.5-4		
<hr/>			
Χοίροι	6-20	2-9	ενδοφλέβια, ενδο- μυϊκά, υποδόρια
Παχυνόμενοι	4-6		
Χοιρίδια	1-2		ενδοπεριτοναϊκά
<hr/>			
Σκυλιά μεγάλα(27-45.5 κιλά)	4-10	7-11	ενδομυϊκά υποδό- ρια, ενδοπεριτο- ναϊκά.
Σκυλιά μέτρια(13.5-27κιλά)	2-6		
Σκυλιά μικρά(4.5-13.5κιλά)	0.5-3		
<hr/>			
Γάτες	0,5-1	7-11	ενδοφλέβια, ενδο- μυϊκά, υποδόρια, ενδοπεριτοναϊκά
<hr/>			
Πουλερικά	0,25-1		υποδόρια
Ηλικία	Διάλυμα *	Δόση	Ποσότητα
1ημ-2εβδ.	1:3	1/2ml διαλυμένο	6,25mg
2εβδ-4εβδ.	1:3	1ml διαλυμένο	12.5mg

4εβδ-8εβδ.	-	1/2ml μη διαλυμένο	25mg
0εβδ, κοτόπουλα κρεοπαραγωγής και μικρές πουλάδες.	-	1ml μη διαλυμένο	50mg
Ενήλικα	-	2ml μη διαλυμένο	100mg

*Για την προετοιμασία του διαλύματος προσθέσατε ένα μέρος Terramycin-50 σε τρία μέρη αποστειρωμένο νερό.

Ινδιάνοι: Για την θεραπεία της μετωπιαίας κολπίτιδας των ινδιάνων ενίετε 1/4ml-1/2ml του φαρμάκου σε κάθε παραρρινικό κόλπο. Η δόση εξαρτάται ανάλογα με την ηλικία των ινδιάνων και την σοβαρότητα της ασθένειας.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

1.Ενδομυικά σε όλα τα μεγάλα ζώα. Ενίεται βαθειά μέσα στις μυϊκές μάζες των πίσω άκρων. Αν και η ενδοφλέβια οδός δεν αντενδείκνυται, αυτή απαιτεί ειδική εκπαίδευση. Στα πουλερικά το φάρμακο ενίεται στο στήθος ή στις μάζες των ποδιών. Ενίεται δόση μεγαλύτερη των 2ml.

2.Υποδόρια το φάρμακο χορηγείται όπου υπάρχει αφθονία λιπώδους ιστού αμέσως υπό το δέρμα. Στα πουλερικά ενίεται υποδόρια πίσω στον τράχηλο και στο μέσον μεταξύ της κεφαλής και της βάσης του τραχήλου.

Η αγωγή με Terramycin-50 διαρκεί 2-3 ημέρες μέχρις ότου τα συμπτώματα εξαφανιστούν

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

A. Διακόψατε τη χορήγηση του φαρμάκου τουλάχιστο 5 ημέρες προ της σφαγής των ζώων.

B. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του γάλακτος που προέρχεται από ζώα που υπεβλήθησαν σε θεραπεία πριν περάσουν 60 ώρες από την τελευταία χορήγηση.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε δροσερό χώρο. Το προϊόν μπορεί να λάβει σκούρα εμφάνιση, αυτό όμως δεν επηρεάζει την δράση του.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΙΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Δεν εφαρμόζεται

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Δεν εφαρμόζεται

Να πλένονται τα χέρια του χρήστη μετά την χρήση.

Να χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή
Να φυλάγεται μακριά από τα παιδιά
Τηλ. Κέντρου Δηλ. 2107793777

ΑΜΚ: 24598/93/11-5-1994