

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Δικαιούχος σήματος : Pfizer Inc, NY, USA

Παραγωγός υπεύθυνος και για την απελευθέρωση της παρτίδας:

ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, ΑΥΛΩΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: Pfizer Hellas ΑΕ, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν.

Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

TERRAMYCIN 5,5% SOLPO

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε 1ml του προϊόντος περιέχει:

ΟΧΥΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ ΔΙΔΡΑΤΗ 217.40mg

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Η Terramycin 5.5% soluble power, ενδείκνυται για τον έλεγχο και την θεραπεία :

- μολύνσεων του γαστρεντερικού σωλήνα,
- μολύνσεων του αναπνευστικού συστήματος,
- μολύνσεων του ουρογεννητικού συστήματος,
- σηψαιμιών,

-λοιμώξεων αγνώστου αιτιολογίας, για την αντιμετώπιση των οποίων επιζητείται ευρέως φάσματος αντιμικροβιακή δράση.

Στα ψάρια χρησιμοποιείται με την τροφή ή το νερό, για τον έλεγχο της ελκωτικής δερματίτιδας (*Haemophilus piscium*), της δοθιήνωσης (*Aeromonas salmonicida*), της βακτηριακής αιμορραγικής σηψαιμίας (*Aeromonas liquefaciens*), και της σηψαιμίας από *Pseudomonas fluorescens*.

Το φάρμακο χρησιμοποιείται και προληπτικά σε περιπτώσεις άμεσης απειλής μόλυνσης.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν αναφέρονται

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι τετρακυκλίνες κατά την περίοδο ανάπτυξης των οδόντων περιλαμβανομένου και του τελευταίου σταδίου της εγκυμοσύνης προκαλεί δυσχρωματισμό τους.

7. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

<u>Είδη ζώων</u>	<u>Ποσότητα δραστικής ουσίας</u>	<u>Ποσότητα ιδιοσκευάσματος</u>
	<u>(oxytetracycline HCL)</u>	<u>(Terramycin-5.5% sol powd)</u>
-Μόσχοι	9-17.5mg/kg σ.β (διαμε- μένα σε δύο δόσεις)	16-32g/100kg σ.β. (διαμε- μένα σε δύο δόσεις)
-Βοοειδή	2.2-4.4mg/kg σ.β(διαμε- μένα σε δύο δόσεις)	4-8g/100kg σ.β. (διαμε- μένα σε δύο δόσεις)
-Πρόβατα	22mg/kg σ.β.	4g/10kg σ.β.
-Χοίροι	11-27.5mg/kg σ.β. ή 4.4-13.9g/50 lt νερό	2-5g/10 kg σ.β. ή 80-250g/50 lt νερό
-Ορνίθες και ινδιάνοι	3.8-15 g/50 lt νερό	70-270g/50 lt νερό
-Σκύλοι και γάτες	55mg/kg σ.β. (διαμε- μένα σε δύο δόσεις)	1g/kg σ.β. (διαμε- μένα σε δύο δόσεις)

-Μινκ	55mg/kg σ.β. (διαιρέ- μένα σε δύο δόσεις)	1g/kg σ.β. (διαιρέ- μένα σε δύο δόσεις)
-Ωδικά πτηνά	41-125mg/500ml νερό	0.75-2.3g/500ml νερό
-Ψάρια	75 mg/kg σ.β.	13.5 g/10kg σ.β.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Τα παραπάνω δοσολογικά σχήματα αποτελούν οδηγίες γενικής χρήσεως. Μια θεραπευτική περίοδος 3-5 ημερών είναι συνήθως επαρκής αλλά όπως σε κάθε θεραπεία, η συνολική διάρκειά της εναπόκειται στην κρίση του κτηνιάτρου.

Η Terramycin-5.5% soluble powder συνιστάται για χορήγηση από το στόμα με το πόσιμο νερό. Κατά την διάρκεια της χορήγησης θα πρέπει να απομακρύνεται από τα ζώα κάθε άλλη διαθέσιμη πηγή νερού, μέχρι την πλήρη κατανάλωση του διαλυμένου φαρμάκου. Το προϊόν διατηρεί την αποτελεσματικότητά του για 24 ώρες μετά από την διάλυσή του στο νερό. Για αυτό τον λόγο θα πρέπει να παρασκευάζονται καινούρια διαλύματα καθημερινά.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση με συσκευές αυτόματης χορήγησης νερού.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για ενδομητρικές εγχύσεις. Για τον σκοπό αυτό διαλύουμε 0.5-1gr oxytetracycline HCL (10-20gr Terramycine-5.5%) σε ικανή ποσότητα ζεστού νερού.

10.ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Τα ζώα να μην σφάζονται πριν περάσουν τα πιο κάτω χρονικά διαστήματα από την τελευταία χορήγηση του φαρμάκου.

Μόσχοι: 7 ημέρες

Χοίροι : 5 ημέρες

Ορνίθια κρεοπαραγωγής: 5 ημέρες

Ορνίθια ωοπαραγωγής: 14 ημέρες

Ινδιάνοι: 14 ημέρες

Ο χρόνος αναμονής για το γάλα είναι 60 ώρες.

Ψάρια: 21 ημέρες σε θερμοκρασία 20C

11.ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό χώρο.

12. ΕΙΔΙΚΗ (ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣ)

Δεν αναφέρονται

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΆΛΛΩΝ ΠΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Δεν αναφέρονται

Να χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή .

Να φυλάγεται μακριά από τα παιδιά.

Τηλ. Κέντρου Δηλ.: 210 7793777

ΑΜΚ: 24598/93/11-5-1994