

## ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

### TERRAMYCIN LONG ACTING INJECTABLE SOLUTION

#### 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Παραγωγός υπεύθυνος και για την απελευθέρωση της παρτίδας:

Pfizer PGM, Zone Industrielle-9 routes des industries 37530 Poce sur Cisse, AMBOISE, FRANCE

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: Pfizer Hellas ΑΕ, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800

#### 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ TERRAMYCIN 200 LONG ACTING INJECTABLE SOLUTION

#### 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε 1ml του προϊόντος περιέχει:

ΟΧΥΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ ΔΙΗΥΔΡΑΤΗ 217.40mg

#### 4. ΕΝΔΕΙΞΗ (ΕΙΣ)

Γενικά η οξυτετρακυκλίνη, ενδείκνυται για την θεραπεία λοιμώξεων που οφείλονται σε μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην δράση της οξυτετρακυκλίνης, όπως ενός μεγάλου αριθμού θετικών και αρνητικών κατά Gram βακτηρίων, Mycoplasma spp, ρικετσιών, πρωτοζώων και χλαμυδίων.

**-Βοοειδή:** Αναπλάσμωση, βακτηριακή εντερίτιδα, ποδοδερματίτιδα λεπτοσπείρωση, πνευμονία, λοιμώδης πυελονεφρίτιδα και αντιμετώπιση επιμολυσμένων τραυμάτων. Επιπλέον για τον έλεγχο και θεραπεία του πυρετού μεταφοράς και μετεγχειρητικών ή επιλόχειων λοιμώξεων.

**-Πρόβατα-αίγες:** Ενζωοτική χλαμυδοφιλική αποβολή, πνευμονία, λοιμώξεις του πέλματος, ποδοδερματίτιδα, επιλόχεια μητρίτιδα, λοιμώδης πολυαρθρίτιδα και αντιμετώπιση επιμολυσμένων τραυμάτων. Επιπλέον για τον έλεγχο και θεραπεία μετεγχειρητικών ή επιλόχειων λοιμώξεων.

**-Χοίροι:** Πνευμονία, βακτηριακή εντερίτιδα, ερυσίπελας, λεπτοσπείρωση, λοιμώδους πολυαρθρίτιδας, αντιμετώπιση επιμολυσμένων τραυμάτων.

Προληπτική χορήγηση για την αντιμετώπιση της ατροφικής ρινίτιδας, ( μείωση της βαρύτητας της νόσου).

Επιπλέον για τον έλεγχο και τη θεραπεία πνευμονίας λόγω μετακίνησης ή μεταφοράς των ζώων, σύνδρομο MMA, διάρροιας των χοιριδίων και μετεγχειρητικών ή επιλόχειων λοιμώξεων.

#### 5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αντενδείκνυται σε άλογα, σκύλους και γάτες.

Να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ζώα με ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια.

## **6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Οι τετρακυκλίνες κατά την περίοδο ανάπτυξης των οδόντων περιλαμβανομένου και του τελευταίου σταδίου της εγκυμοσύνης προκαλούν δυσχρωματισμό τους.

## **7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ**

Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες.

## **8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ( ΟΙ ) ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Το Terramycin Long Acting inj. sol., χορηγείται ενδομυκικά άπαξ με δόση 1ml / 10 kg σ.β. ή 20 mg / kg σ.β. , σε χοίρους , πρόβατα και αίγες.

Γενικά μία μόνο χορήγηση 1ml /10 kg σ.β., είναι αρκετή για την θεραπεία λοιμώξεων οφειλομένων σε ευαίσθητους μικροοργανισμούς.

## **9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

**-Βοοειδή :** Η ενδομυκική χορήγηση πρέπει να γίνεται βαθιά εντός των μυικών μαζών.

Ανάλογα το μέγεθος του ζώου, χρησιμοποιείται βελόνη αναλόγου μήκους και διαμέτρου. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο πιθανός ερεθισμός του ιστού στην περιοχή της ένεσης, συνιστάται να μην χορηγείται πάνω από 10ml σε κάθε σημείο ένεσης.

**-Χοίροι:** Για χοίρους βάρους έως και 10 κιλά, αναλογεί δόση 1ml ανά ζώο.

Για χοίρους βάρους άνω των 10 κιλών, χορηγήσατε 1ml/10kg σ.β., ενδομυκικά σε ένα μόνο σημείο.

Μέγιστος όγκος ένεσης για τους χοίρους, 5 ml ανά σημείο.

**-Πρόβατα -αίγες:** Χορηγήσατε 1ml /10kg σ.β., ενδομυκικά .

Για να ελαχιστοποιηθεί πιθανός ερεθισμός του ιστού στην περιοχή της ένεσης, συνιστάται να μην χορηγείται πάνω από 5ml σε κάθε σημείο ένεσης. Σε ζώα άνω των 50 κιλών συνιστάται η δόση να ενίεται σε δύο διαφορετικά σημεία.

## **10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Βοοειδή : Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 37 ημέρες

Γάλα: 7,5 ημέρες( 180 ώρες)

Πρόβατα: Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 21 ημέρες

Γάλα: 7 ημέρες ( 168 ώρες )

Αίγες: Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 32 ημέρες

Γάλα: 7 ημέρες ( 168 ώρες)

Χοίροι: Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 32 ημέρες

## **11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Διατηρείται το φάρμακο σε θερμοκρασία κάτω των 30C βαθμών Κελσίου και πάνω από τους -2C, αποφεύγοντας την πήξη του φαρμάκου. Το προϊόν μπορεί να λάβει σκούρα εμφάνιση, με την έκθεση του στον αέρα, αυτό όμως δεν μειώνει την δραστηριότητά του.

## **12. ΕΙΔΙΚΗ( ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)**

Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση του φαρμάκου.

Φυλάξτε το φάρμακο μακριά από τα παιδιά.

Τηλ. Κέντρου Δηλ. : 210 7793777

A.M.K.:38674/11-6-08

Κύπρος: ΚΑΚ:Pfizer Hellas AE, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800

Υπεύθυνος διανομέας στη Κύπρο: VitaTrace Nutrition Ltd, 2033 Στρόβολος, Κύπρος, τηλ:22 426527, ΑΑΚ: 16128

