

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: Pfizer Hellas AE, Λ.Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
Norbrook Laboratories Ltd, Station Works Newry, Co Down, N. Ireland

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Tetra Delta

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Το περιεχόμενο μιας σύριγγας 10 ml περιέχει:

Δραστικό (ά) συστατικό (ά):

Novobiocin (ως novobiocin sodium)	100 mg
Neomycin sulphate Ph. Eur	150 mg
Procaine penicillin G B.P.	100.000 IU
Dihydrostreptomycin sulphate B.P.(Vet)	125 mg
Prednisolone anhydrous PH.Eur	10 mg

σε μία ελαιώδη βάση.

Έκδοχα: Aluminium Monostearate
Arachis Oil

4. ΕΝΔΕΙΞΗ (ΕΙΣ)

Αντιβακτηριακή και αντιφλεγμονώδης δράση. Το TETRA - DELTA συνιστάται για τη θεραπεία των μαστίτιδων στις αγελάδες.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν έχουν αναφερθεί.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι πενικιλίνες είναι δυνατόν να προκαλέσουν υπερευαισθησία (αλλεργία) μετά από έγχυση, εισπνοή, κατάποση ή δερματική επαφή. Αλλεργικές αντιδράσεις προς αυτές τις ουσίες μπορεί, περιστασιακά, να είναι σοβαρές.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Αγελάδες

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ , ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ (ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Γενικά, η έγχυση του περιεχομένου μιας σύριγγας σε κάθε μολυσμένο τεταρτημόριο μαστού είναι αρκετή για τη θεραπεία του. Σε σοβαρές όμως περιπτώσεις, εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να επαναληφθεί η θεραπεία μετά από 24 ή 48 ώρες.

Το TETRA - DELTA χορηγείται ενδομαστικά.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ανακινήστε καλά το προϊόν της σύριγγας πριν από την έγχυση.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Το γάλα αγελάδων που ευρίσκονται υπό θεραπεία με TETRA-DELTA δεν πρέπει να δίνεται προς ανθρώπινη κατανάλωση. Το γάλα των αγελάδων που αρμέγονται δύο φορές την ημέρα μπορεί να δοθεί για κατανάλωση από τον άνθρωπο μετά από 72 ώρες (δηλαδή από το έκτο άρμεγμα) από το τέλος της θεραπείας.

Ο τρόπος σκέψης του κτηνίατρου, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται άλλα προγράμματα άρμεξης, βασίζεται στο ότι ο χρόνος μεταξύ τελευταίας θεραπείας και απόδοσης του γάλακτος προς κατανάλωση πρέπει να είναι πάντοτε 72 ώρες. Έτσι, για παράδειγμα, εάν οι αγελάδες αρμέγονται τρεις φορές την ημέρα, τότε να δοθεί το γάλα στην κατανάλωση από την 9η άρμεξη και μετά. Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρο εάν εφαρμόζονται άλλες τεχνικές άρμεξης.

Ζώα τα οποία υποβλήθηκαν σε θεραπεία με TETRA-DELTA δεν πρέπει να σφάζονται πριν περάσουν 7 ημέρες από το τέλος της θεραπείας.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25C.

12. ΕΙΔΙΚΗ (ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣ)

1. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν γνωρίζετε ότι είσαστε αλλεργικοί ή σας έχουν συστήσει να μην εργάζεστε με τέτοιου είδους προϊόντα.

2. Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με μεγάλη προσοχή ώστε να αποφευχθεί η επαφή με αυτό, παίρνοντας όλα τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα.

3. Εάν μετά από επαφή με το προϊόν παρουσιάσετε συμπτώματα, όπως δερματικό εξάνθημα, τότε ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε στον ιατρό τις οδηγίες αυτές. Οίδημα στο πρόσωπο, τα χείλη ή τα μάτια ή δυσκολία στην αναπνοή είναι σοβαρότερα συμπτώματα και απαιτείται γρήγορη ιατρική αντιμετώπιση.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί με 20 σύριγγες μιας χρήσης των 10 ml.

Τηλ. Κέντρου Δηλ.: 210 7793777

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ

Αριθμός Αδείας Κυκλοφορίας: 12546/22-4-1994