

## ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

# VERAMIX® 60 mg ΣΠΟΓΓΟΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

### 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

The Upjohn Company, Kalamazoo, USA

Παρασκευαστής:

Veterin ABEE, 19300 Ασπρόπυργος, Αττική, Τ.Θ. 26, Τηλ: 210 5575770

Υπεύθυνος άδειας κυκλοφορίας: Pfizer Hellas ΑΕ, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800

### 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Veramix 60mg, σπόγγοι

### 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ( Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ( Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε σπόγγος περιέχει:

Οξική Μεδροξυπρογεστερόνη 60 mg

### 4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Οι VERAMIX Sheep Sponges ενδείκνυται για τον έλεγχο του οιστρικού κύκλου των προβάτων, επιφέροντες τον συγχρονισμό κατά την διάρκεια της κανονικής περιόδου αναπαραγωγής. Ο συγχρονισμός προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

1. Περισσότερο οικονομική χρήση στη συμπληρωματική διατροφή των εγκύων αμνάδων αφού όλες βρίσκονται στο αυτό στάδιο εγκυμοσύνης.
2. Μειωμένο κόστος εργασίας κατά την γέννα και ευκολότερη επίβλεψη των αρνιών λόγω της μαζικής γεννήσεως τους.
3. Περισσότερο αποτελεσματικός σχεδιασμός του προγράμματος ευνουχισμού, της διανομής και του εμβολιασμού, της διευθέτησης των βοσκοτόπων και της εμπορίας των παχυνόμενων αρνιών, λόγω της μαζικότερης παραγωγής αυτών.
4. Περισσότερο αποτελεσματική αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού λόγω της μικρότερης περιόδου των γεννήσεων των αρνιών, πράγμα το οποίο επιφέρει λιγότερες δυσκολίες στις άλλες αγροτικές εργασίες.
5. Λύνει το πρόβλημα των ορφανών αρνιών με την μεταφορά αυτών σε άλλες αμνάδες.
6. Βοηθά στο χρονικό σχεδιασμό της τεχνικής σπερματέγχυσης.

### 5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ανώριμα ζώα των οποίων ο κόλπος τραυματίσθηκε κατά την τοποθέτηση του σπόγγου δεν θα πρέπει να θεραπεύονται. Επίσης η αγωγή δεν συνιστάται σε αμνάδες με κολπικές εκκρίσεις ή μετά από αποβολή.

### 6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Κατά την απομάκρυνση του σπόγγου πιθανόν να παρατηρηθούν εκκρίσεις κολπικών υγρών. Τα υγρά ταχέως στεγνώνουν και δεν επηρεάζουν την ικανότητα σύλληψης στις συγχρονισμένες αμνάδες.

### 7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Αμνάδες (προβατίνες).

### 8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χορηγείται ενδοκολπικώς.

### Ημέρα 1η:

Σε όλες τις αμνάδες τοποθετούνται οι VERAMIX Sheep Sponges την ίδια ημέρα. Κάθε αμνάδα κρατείται σε ορθία θέση από ένα βοηθό, ενώ ο δεύτερος επικαλύπτει με άφθονη κρέμα ένα σπόγγο και τον τοποθετεί στον εφαρμοστή.

- Ο σπόγγος εισάγεται από το φαρδύτερο άκρο του εφαρμοστή και ωθείται με το έμβολο μέχρι περίπου το μέσον του εφαρμοστή.
- Ο εφαρμοστής εισάγεται με προσοχή βαθειά μέσα στον κόλπο και στη συνέχεια το έμβολο προς τα μέσα ώστε να αποβληθεί ο σπόγγος.
- Αφαιρείται ο εφαρμοστής και εν συνεχεία το έμβολο, ενώ παραμένουν δύο νήματα, τα οποία εξέρχονται του αιδοίου.

Ο εφαρμοστής πρέπει να σκουπίζεται μετά από κάθε εισαγωγή και να πλένεται κανονικά, με αντισηπτικό διάλυμα.

#### **Ημέρα 14η:**

Οι σπόγγοι αφαιρούνται μετά από 13 ημέρες (παραμονή μεγαλύτερη από 16 ημέρες είναι δυνατόν να μειώσει το βαθμό σύλληψης).

Οι αμνάδες θα αρχίσουν να ζευγαρώνουν την 15 ημέρα με εμφάνιση οίστρου στο μέγιστο βαθμό την 16η, 17η και 18η ημέρα. Καλό είναι το κοπάδι να περιορίζεται κατά την περίοδο του ζευγαρώματος σε μικρούς χώρους (20-25 αμνάδες ανά εκτάριο). Καλό είναι να χρησιμοποιούνται μαρκαρισμένοι κριοί, ώστε να γίνεται καλύτερη επίβλεψη και καταγραφή των αμνάδων που ζευγαρώνονται. Περί τις 17 ημέρες μετά τον πρώτο συγχρονισμένο οίστρο, οι αμνάδες που δεν συνέλαβαν παρουσιάζουν οίστρο με τον ίδιο συγχρονιστικό τρόπο όπως παρουσίασαν με την αφαίρεση του σπόγγου.

Κατά την διάρκεια του δεύτερου οίστρου απαιτούνται λιγότεροι κριοί.

Μια εναλλακτική λύση είναι, οι κριοί να εισέλθουν στο κοπάδι μεταξύ του πρώτου και δεύτερου συγχρονισμένου οίστρου περίπου 10-12 ημέρες μετά την αφαίρεση του σπόγγου, γιατί μπορεί να παρουσιαστεί καλύτερος βαθμός σύλληψης κατά το δεύτερο οίστρο απ' ό,τι στον πρώτο.

Για να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα από την χρησιμοποίηση των VERAMIX Sheep Sponges, είναι βασικό αν ακολουθηθούν τα εξής:

#### **1. Επιλογή των αμνάδων (προβατίνων)**

Οι προβατίνες πρέπει να είναι σεξουαλικά ώριμες, αποδεδειγμένης γονιμότητας με φυσιολογικό γεννητικό κύκλο και υπό καλή διατροφή

#### **2. Επιλογή των κριών**

Οι κριοί πρέπει να είναι αποδεδειγμένης γονιμότητας και υπό καλή διατροφή. Εάν είναι αναγκαίο μπορούν να λάβουν συμπληρωματική διατροφή για ένα μήνα περίπου πριν το ζευγάρωμα.

#### **3. Αριθμός των κριών**

Ο αριθμός των κριών πρέπει να αυξηθεί σε αναλογία ενός προς 10-15 αμνάδες. Ο απαιτούμενος αριθμός υπόκειται σε διακυμάνσεις αναλόγως του είδους και του γένους.

**Προσοχή:** Οι των VERAMIX Sheep Sponges, δεν αποβλέπουν ούτε προσφέρονται για την θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας.

Για τον συγχρονισμό του οίστρου των προβάτων. Τοποθετείται ενδοκολπικώς.

## **9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

### **10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Ο χρόνος αναμονής για το γάλα και κρέας των προβάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, είναι μηδέν (0).

### **11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Να φυλάσσεται σε συνθήκες περιβάλλοντος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 60 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Κυτίο 20 σπόγγων και κρέμα 70 g.

Κυτίο 50 σπόγγων και κρέμα 70 g.

Αρ. Αδείας Κυκλοφορίας: 825187/349

**Προσοχή στην διάθεση του προϊόντος:** Το προϊόν χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου και μόνον από κτηνίατρο σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 259/12-8-1998. Απαγορεύεται η κατοχή του προϊόντος από τον Υπεύθυνο της Μονάδος.

\*χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου\*  
ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: (210) 77.93.777

Υπεύθυνος Άδειας Κυκλοφορίας : **PFIZER HELLAS AE**  
Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 154 51, Αθήνα  
Τηλ: 210 6785800