

## ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

### 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας < και παραγωγός: Pfizer Hellas ΑΕ, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

Pfizer Animal Health SA, LLN, Belgium

Δικαιούχος Σήματος: Pfizer Inc, USA

### 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VANGUARD CPV

### 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε μία δόση 1 ml περιέχει:

<u>Δραστικές ουσίες</u>	<u>Ποσότητα</u>
Canine Parvovirus, NL – 35 D Live modified	> 10 <sup>7</sup> TCID <sub>50</sub>

<u>Εκδοχα</u>	<u>Ποσότητα</u>
Neomycin sulfate	< 50 µg
Gentamycin sulfate	< 50 µg
Water for injection	1 ml

### 4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Για την ενεργητική ανοσοποίηση των σκύλων και την πρόληψη της θνησιμότητας και των κλινικών συμπτωμάτων, που περιλαμβάνουν λευκοπενία, καθώς και την μείωση της διασποράς το ιού, που προκαλείται από το canine parvovirus ( τύποι 2a, 2b και 2c)

### 5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το εμβόλιο προορίζεται για χρήση μόνο σε σκύλους. Όπως συμβαίνει και με κάθε άλλο εμβόλιο, αντενδείκνυται για ένα μήνα μετά τη χορήγηση υπεράνοσου ορού φαρμάκων που προκαλούν ανοσοκαταστολή, η χορήγηση του VANGUARD CPV. Συνιστάται όπως μη χορηγείται σε έγκυα ζώα ή ζώα που δεν είναι υγιή. Μη χρησιμοποιείται σύριγγες ή βελόνες που έχουν αποστειρωθεί με χημικές μεθόδους.

### 3. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

Κυνάρια και σκύλοι από την ηλικία των 5 βδομάδων.

### 6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πολύ σπάνιες και δεν συνιστάται κάποια συγκεκριμένη θεραπεία, εάν εμφανισθούν τέτοιες. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, εμφανισθεί αλλεργική αντίδραση χορηγείσθε αδρεναλίνη. Το VANGUARD CPV περιέχει ίχνη αντιβιοτικού. Είναι δυνατόν, σε οποιαδήποτε εκτροφή ζώων, ορισμένα από αυτά να μην αντιδράσουν στον εμβολιασμό.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης,, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

**7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ**

Σκύλος

**8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

Με το VANGUARD CPV μπορούν να εμβολιάζονται νεαροί σκύλοι από την ηλικία των 5 εβδομάδων. Όταν οι σκύλοι που πρωτοεμβολιάζονται έχουν ηλικία μικρότερη των 12 εβδομάδων πρέπει να επαναεμβολιάζονται κάθε 2 – 3 εβδομάδες έως την ηλικία των 18 – 22 εβδομάδων. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η πιθανότητα εξουδετέρωσης των εμβολιακών αντιγόνων από τα υπάρχοντα μητρικά αντισώματα.

Μία μόνο δόση του VANGUARD CPV είναι αρκετή για την πλήρη ανοσοποίηση σκύλων μεγαλύτερων των 22 εβδομάδων. Συνιστάται ο επαναληπτικός εμβολιασμός κάθε χρόνο. Χορηγείτε υποδόρια, όλο το περιεχόμενο του φιαλιδίου ( 1 ml ).

**9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Ανακινείστε καλά το φιαλίδιο πριν τη χρήση.

**10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Δεν εφαρμόζεται.

**11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία +2 C - +8 C προστατευμένο από το φώς.

Να μην καταψύχεται.

**12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)**

Καμμία.

**13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

**14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Κουτί που περιέχει 25 φιαλίδια της 1 δόσης VANGUARD CPV .

Να χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή.

Να φυλάγεται μακριά από τα παιδιά.

Τηλ. Κέντρου Δηλ.:210 7793777

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

ΑΜΚ :4232/17 – 11 - 95

Δικαιούχος Σήματος:Pfizer Inc, USA